



Dow AgroSciences

Broadway®

HERBICIDA

Grânulos dispersíveis em água (WG)
com 23 g/kg ou 2,3% (p/p) de florasulame,
68 g/kg ou 6,8% (p/p) de piroxsulame e
68 g/kg ou 6,8% (p/p) de cloquintocete-mexilo

Conteúdo: 550 g e

Distribuído por:



Lusosem
produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins, n.º10-9.ºA
1495-137 Algés
Tel: 21 413 12 42- Fax: 21 413 12 84

® Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÉUTICO LEIA O RÓTULO**

Data de fabrico e lote: ver embalagem

Autorização provisória de venda n.º 4031 concedida pela DGAV:
Dow AgroSciences Ibérica S.A. - c/ Ribera del Loira 4-6; 4.ª planta
28042 MADRID-ESPAÑA - Tel. 00 34 91 740 77 00

P003642091411

BASE LABEL

BASE LABEL

BROADWAY® contém as substâncias ativas florasulame e piroxsulame, pertencentes à família química das triazolopirimidinas sulfonanimidas. É absorvido por via foliar e radicular e atua por inibição da biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (inibindo a atividade da enzima acetolactato sintase, ALS).

BROADWAY é um herbicida de pós-emergência seletivo para trigo para controlo de infestantes gramíneas e dicotiledóneas.

CULTURAS AUTORIZADAS

BROADWAY pode ser utilizado em todas as variedades de trigo duro e nas variedades de Inverno (ciclo longo) de trigo mole.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

- **Monocotiledóneas:** Rabo-de-raposa (*Alopecurus myosuroides*); balancos (*Avena* spp.); Bromo-mole (*Bromus* spp.; *Bromus sterilis*); azevéns (*Lolium* spp.); erva-cabecinha (*Phalaris minor*).

- **Dicotiledóneas:** Amor-de-hortelão (*Galium aparine*), verónicas (*Veronica* spp.), saramago (*Raphanus raphanistrum*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), camomila (*Matricaria* spp.), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), morugem-branca (*Stellaria media*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

- **Dicotiledóneas:** Erva moleirinha (*Fumaria* spp.).

DOSE DE APLICAÇÃO

Aplicar **BROADWAY** em pulverização normal na dose de 275 g produto por hectare, diluído em 200 a 400 litros de água por hectare.

Com o objectivo de melhorar a eficácia do tratamento, deverá ser adicionado à calda do herbicida um dos molhantes GENAPOL ou CODACIDE OIL, ambos autorizados para utilização em mistura com herbicidas na cultura do trigo. Aplicar qualquer um destes molhantes na dose de 1 litro por hectare.

ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO

O **BROADWAY** é um herbicida de pós-emergência que pode ser aplicado em trigo desde o estado de três folhas (BBCH 13) até ao início do encanamento (BBCH 32), com os estados B21 e B23 da cultura (início do afilhamento) como momento óptimo para o controlo das infestantes, para as quais a maior suscetibilidade coincidirá, para as espécies gramíneas, com o período da 3ª folha verdadeira até à fase inicial do afilhamento (3º filho e para as dicotiledóneas, entre as 6 e 8 folhas verdadeiras.

O crescimento das infestantes é interrompido depois da aplicação e os primeiros sintomas aparecem entre 5 a 10 dias depois do tratamento, sendo a eficácia máxima obtida 6 a 8 semanas depois da aplicação.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Culturas adjacentes

Recomenda-se aplicar apenas quando as condições atmosféricas sejam favoráveis e quando a velocidade do vento seja inferior a 18 km/h. Durante a aplicação, é importante utilizar bicos adequados e manter uma distância mínima de segurança de 5 m, para evitar o arrastamento para culturas adjacentes.

Culturas seguintes

Seguindo as práticas habituais de rotação de culturas, depois de uma aplicação de **BROADWAY**, pode-se semear qualquer das culturas normalmente utilizadas na zona, tais como cevada, colza, grão-de-bico, girassol, ervilha, milho, trigo de Inverno, trigo de Primavera, batata, prados de gramíneas e beterraba.

No caso de falha da cultura, decorridas 8 semanas depois da aplicação de **BROADWAY** podem semear-se as seguintes culturas: girassol, milho, batata, beterraba sacarina, soja e prados de gramíneas

Antes de semear outras culturas consultar o Serviço Técnico da Dow AgroSciences Ibérica.

Prevenção de ocorrência de resistência

A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente suscetíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas com modo de ação diferente.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

O volume de calda pode variar entre 200 e 400 litros/ha, de modo a molhar bem as infestantes. Encher o tanque do pulverizador com metade da água necessária e iniciar a agitação. De seguida, adicionar a quantidade necessária de **BROADWAY**. Quando a mistura estiver completamente homogeneizada, adicionar a dose recomendada de um molhante autorizado (GENAPOL ou CODACIDE OIL), e completar o volume de água, agitando continuamente até ao final da aplicação para assegurar uma mistura homogênea do produto. Utilizar sempre água limpa. Preparar a calda imediatamente antes da aplicação.

LIMPEZA DO TANQUE

Enxaguar cuidadosamente o tanque e o equipamento de pulverização depois da aplicação: primeiro com água limpa, depois encher o tanque e juntar uma solução de limpeza adequada. No final enxaguar de novo com água limpa.

OBSERVAÇÕES

O produto pode ser aplicado com temperaturas entre 5° C e 25° C.

Para misturar com outros produtos autorizados em trigo consultar previamente o Serviço Técnico da Dow AgroSciences Ibérica.

Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow.

Edição CLP1



Dow AgroSciences

Broadway®

HERBICIDA

Grânulos dispersíveis em água (WG)
com 23 g/kg ou 2,3% (p/p) de florasulame,
68 g/kg ou 6,8% (p/p) de piroxsulame e
68 g/kg ou 6,8% (p/p) de cloquintocete-mexilo

Conteúdo: 550 g e

Distribuído por:



Rua General Ferreira Martins, nº10-9ªA
1495-137 Algés
Tel: 21 413 12 42- Fax: 21 413 12 84

® Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO**

Data de fabrico e lote: ver embalagem

Autorização provisória de venda n.º 4031 concedida pela DGAV:
Dow AgroSciences Ibérica S.A. - c/ Ribera del Loira 4-6; 4ª planta
28042 MADRID-ESPANHA - Tel. 00 34 91 740 77 00

BASE LABEL

BASE LABEL