



#### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS ATENÇÃO

- Ficha de segurança fornecida a pedido (EUH210).
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea (H317).
- Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H411).
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto (P270).
- Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto (P280).
- Recolher o produto derramado (P391).
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos (P501).
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, exceto nas aplicações em arrozais nas doses indicadas (SP1).
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros no caso de tratamentos aéreos (SPe3).
- No caso de aplicações aéreas, tomar em consideração os aspetos inerentes a esta técnica de aplicação, de modo a não contaminar as áreas circunvizinhas (SPePT3).
- Após reposição do nível de água nos canteiros, os mesmos deverão permanecer fechados durante 4 dias, podendo a circulação de água ser reposta ao fim deste período (SPePT2).

#### Intervalo de Segurança - 60 dias em arroz.

##### Tratamento de emergência:

- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar (P305+P351+P338).
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes (P302+P352).
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico (P333+P313).
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo (P101).
- EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Não provocar o vômito (P301+P310+P331).

#### EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TELEF: 808 250 143

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



# Clincher® Plus

## HERBICIDA

**Concentrado para emulsão (EC)  
com 200 g/L ou 21,05 % (p/p) de cihalofop-butilo**

**CLINCHER PLUS** é um herbicida selectivo para a cultura do arroz, tanto de sementeira directa como de transplantação

Data de fabrico e lote: ver embalagem

#### ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO**

## Conteúdo líquido: 5 L e

Distribuído por:  
 **Lusosem**  
produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins, nº10-9ª A  
1495-137 ALGÉS  
Tel: 214131242 - Fax: 214131284  
e-mail: lusosem@lusosem.pt  
www.lusosem.pt

Autorização de venda  
n.º 0477 concedida pela DGAIV:  
**Dow AgroSciences Ibérica, S.A.**  
c/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta  
28042 MADRID - ESPANHA  
Tel.: 91 740 77 00

**CLINCHER® PLUS** contém a substância activa cihalofop-butilo, pertencente à família química ariloxifenoxipropionato. Apresenta rápida absorção foliar e moderada translocação no simplasto, com acumulação nos órgãos meristemáticos. Actua por inibição da biossíntese dos ácidos gordos (inibindo a actividade da enzima acetil Coenzima A carboxilase, ACCase).

#### UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

**CLINCHER PLUS** pode ser aplicado em arroz de sementeira directa e de transplantação.

O produto deve ser aplicado uma vez por campanha na dose de 1,5 L/ha, estando a cultura entre a primeira folha verdadeira (BBCH 11) e o fim do afilhamento (BBCH 29). Para o controlo de *Echinochloa* spp., tratar quando esta infestante se encontra no estado de uma a quatro folhas e até ao pleno afilhamento do arroz. Para o controlo de *Leptochloa fascicularis*, tratar quando esta infestante se encontra no estado de duas a quatro folhas. A aplicação para controlo de *Paspalum distichum* deve ser realizada até ao pleno afilhamento do arroz.

#### INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

*Echinochloa* spp., *Leptochloa* spp., *Panicum dichotomiflorum*, *Paspalum distichum*.

#### INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

*Digitaria sanguinalis* e *Setaria* spp.

#### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- A mistura de **CLINCHER PLUS** com herbicidas fenoxiderivados (MCPA) pode, nalguns casos, reduzir a eficácia herbicida de **CLINCHER PLUS** sobre *Echinochloa* spp.
- Para misturas com outros herbicidas usados na cultura do arroz, consultar previamente o Serviço Técnico da Dow AgroSciences Ibérica.
- A aplicação de **CLINCHER PLUS** não constitui qualquer incompatibilidade com posteriores aplicações de produtos insecticidas ou herbicidas autorizadas para o arroz e de utilização habitual nesta cultura.
- Evitar o arrastamento para as culturas adjacentes, especialmente milho e fruteiras.
- Evitar aplicar o produto depois de decorridas 6 horas após a realização da calda. Caso não seja possível, coar a calda por um filtro com malha > 300 pm.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha substâncias activas da família química ariloxifenoxipropionato, mais do que uma vez por campanha.

#### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária.

Juntar a quantidade de **CLINCHER PLUS** a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

#### MODO DE APLICAÇÃO

**CLINCHER PLUS** não necessita de adição de molhante, já que este se encontra incorporado na formulação. Previamente à aplicação de **CLINCHER PLUS**, baixar ao mínimo o nível de água da parcela, e mantê-la nesse nível até 24/48 horas depois da aplicação. Uma pequena quantidade de água no campo, no momento da aplicação, sempre que as folhas das infestantes estejam acima do nível de água, não diminui a eficácia do tratamento. Não verter para o exterior as águas dos arrozais tratados até que tenham decorrido 24 horas.

#### TIPOS DE APLICAÇÃO

As aplicações podem ser realizadas tanto por meios aéreos como terrestres, utilizando-se em ambos os casos quantidades suficientes de calda que assegurem um bom recobrimento: 200 - 400 L/ha em aplicação terrestre e 100 L/ha em aplicação aérea. Recomenda-se aplicar o **CLINCHER PLUS** em pulverização normal. Preparar a calda imediatamente antes da aplicação. A aplicação pode ser feita com qualquer equipamento de pulverização que forme gotas de diâmetro superior a 50 microm. Recomenda-se o uso de bicos anti-arrastramento com uma redução de pelo menos 75%. Na aplicação terrestre utilizar pulverizador hidráulico transportado por tractor. Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.

**ADVERTÊNCIA:** As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

eMarca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

Edição CLP 1