

# INDAR<sup>\*</sup> 5EW



## VANTAGENS

- **Eficácia** preventiva e curativa.
- **Resistência à lavagem** pela chuva uma vez que penetra rapidamente na planta (2-4 horas).
- Possui **sistemia ascendente e translaminar**, com forte fixação nas ceras cuticulares das folhas e frutos.
- **Polivalência**, controla pedrado e monília, com acção sobre o oídio.
- Não favorece o aparecimento de carepa.
- **Controlo pós-colheita**, aplicado antes da colheita, protege a fruta durante a conservação.
- Recomendado em programas de **Protecção Integrada**.



# INDAR<sup>\*</sup> 5EW



### INDAR 5EW\*

Fungicida sistémico  
Emulsão óleo em água com  
50 g/l de fenebuconazol  
Embalagem: 1 L e 80 cc  
APV n.º 3420 concedida pela DGPC  
\* Marca registada Dow AgroSciences



Rua General Ferreira Martins, n.º10-9ºA - 1495-137 ALGÉS  
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt  
[www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

# INDAR<sup>\*</sup> 5EW



**Fungicida sistémico  
para o controlo  
do pedrado e da moniliose**



# INDAR<sup>®</sup> 5EW



## Protecção eficaz

O **INDAR** é um fungicida sistémico, da família dos triazóis, para o controlo do pedrado da macieira e pereira, e da moniliose da ameixeira e cerejeira.

Acção secundária no controlo do oídio.

O **INDAR** aplicado sobre vegetação seca, penetra rapidamente na planta (2-4 horas), evitando a lavagem pela chuva.

O **INDAR** possui sistemias ascendente e translaminar, com forte fixação nas ceras cuticulares das folhas e frutos.

## Acção preventiva e curativa

O **INDAR** tem uma acção preventiva e curativa, permitindo combater infecções de pedrado, até 96 horas após o seu início.

Em condições de baixa temperatura (< 10°C), aconselha-se fazer o tratamento curativo até às 72 horas.

## Selectividade

**INDAR** é totalmente selectivo:

- Não tem efeitos negativos sobre a vegetação (antigiberélico).
- Não interfere na germinação do pólen, pode ser aplicado na floração.
- Selectivo sobre fitoseídeos. Compatível com abelhas.
- Formulação EW - reduz sensibilidade ao PH e dureza da água.
- Não induz a formação de carepa (rugosidade).

# INDAR<sup>®</sup> 5EW

## Macieira e pereira



# NÃO FAVORECE CAREPA

## Pedrado

Para uma protecção óptima no controlo do pedrado da macieira e pereira é muito importante controlar as primeiras infecções.

**INDAR** actua de forma **preventiva e curativa** tanto em frutos como em folhas.

## Estratégia de tratamento

**Dose: 80 ml/hl**

Iniciar as aplicações ao aparecimento da ponta verde das folhas e repetir com uma cadência de 10-12 dias, enquanto se verificarem condições para o desenvolvimento da doença.

Em condições climáticas mais favoráveis à doença e nos estados de maior sensibilidade da cultura, reduzir o intervalo entre aplicações para 10 dias.

Caso existam, devem-se seguir as indicações dos Serviços de Avisos.

Não efectuar mais de 4 tratamentos por campanha.



# INDAR<sup>®</sup> 5EW

## Ameixeira e cerejeira



# INTERVALO SEGURANÇA 3 DIAS

## Moniliose

**INDAR** demonstra elevada eficácia no controlo de monilia em ameixeira e cerejeira, conferindo muito boa **protecção de flores e frutos**.

**Eficácia antes e depois da colheita** - devido ao intervalo de segurança de apenas 3 dias e à afinidade pelas ceras cuticulares, o **INDAR** continua a sua protecção mesmo depois da colheita, durante o armazenamento.

## Estratégia de tratamento

**Floração**

**Maturação do fruto**

**Dose: 100 ml/hl**

**Dose: 100 ml/hl**

Até à queda das pétalas.

2 - 3 aplicações com 7 a 14 dias de intervalo.

Do início da maturação até à colheita.

2- 3 aplicações com 7 a 14 dias de intervalo, realizar a última aplicação 3 dias antes da colheita.

Não efectuar mais de 3 tratamentos por campanha.

