

Insecticida

MIMIC 2F[®]




INSECTICIDA NATURAL

**para controlo de lepidópteros
em pomóideas, vinha,
citrinos e pinheiro**

CERTIS

 **Lusosem[®]**



Insecticida

MIMIC 2F[®]



MODO DE ACÇÃO COMPLETAMENTE INOVADOR

M.A.C. (Moulting Accelerating Compound) - Acelerador de muda

MIMIC 2F* possui uma acção semelhante à hormona de muda (ecdisona) específica das larvas de lepidópteros. Actua sobre as larvas jovens provocando uma muda prematura mortal quando o insecto não se encontra ainda fisiologicamente preparado para ela. As larvas tratadas interrompem imediatamente a sua alimentação evitando-se assim danos prejudiciais para a colheita.

MIMIC 2F* actua essencialmente por ingestão.

ELEVADA EFICÁCIA NO CONTROLO DE LEPIDÓPTEROS

MACIEIRA E PEREIRA - Dose: 60 ml/hl (ou 0,6 L/ha)

Bichado da fruta (*Cydia pomonella*) - As aplicações devem efectuar-se com a ajuda de armadilhas sexuais, para determinar o início do voo dos adultos ou de acordo com as indicações dos Serviços de Avisos. Aplicar após o início das posturas e antes das primeiras eclosões. Repetir passadas 2-3 semanas caso se a curva de voo se prolongar.

VINHA - Dose: 60 ml/hl (ou 0,6 L/ha)

Traças dos cachos (*Eupoecilia ambiguella*, *Lobesia botrana*) - As aplicações devem efectuar-se com a ajuda de armadilhas sexuais que permitam a determinação do início do voo dos adultos ou de acordo com as indicações dos Serviços de Avisos ou com base em observações das posturas nos cachos. Aplicar após o início das posturas e antes das primeiras eclosões das larvas repetindo, se necessário, 2 semanas depois se o voo se prolongar. Piral - Iniciar os tratamentos ao aparecimento das primeiras larvas, repetindo se necessário, 14 dias depois.

CITRINOS - Dose: 60-75 ml/hl + 500 ml/hl de óleo de Verão.

Lagarta mineira dos rebentos dos citrinos (*Phyllocnistis citrella*) - Tratar logo que se observem os primeiros sintomas de ataque nas folhas dos rebentos jovens em crescimento, repetindo, se necessário, 10-14 dias depois. Não efectuar mais de duas aplicações por ano com o produto, alternando com insecticidas de famílias diferentes.

PINHEIRO - Dose: 300-400 ml/ha

Processionária (*Thaumetopoea pityocampa*) - Efectuar uma aplicação após a eclosão dos ovos, sobre as lagartas dos primeiros estados larvares.

VANTAGENS

- ❁ Modo de acção totalmente diferente
- ❁ Elevada eficácia contra lepidópteros
- ❁ Selectivo para a fauna auxiliar
- ❁ Recomendado em Protecção Integrada

MIMIC 2F[®]

Insecticida acelerador de muda.
Suspensão concentrada com 240 g/l de tebufenozida.
APV n.º 3387 concedida pela DGAV



Distribuído por:

CERTIS

www.lusosem.pt

Lusosem[®]