

Usos menores

Cultura	Dose cc/hl	Época de aplicação - I.S.
MELOEIRO <i>Lagartas</i> (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis spp</i>)	20-25	I.S. 3 dias
MORANGUEIRO <i>Tripes</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i> e <i>Heliethrips haemorrhoidalis</i>)	20-25	Horticultura de ar livre e protegida. I.S. 3 dias
MOSTARDAS <i>Lagarta mineira das folhas</i> (<i>Liriomyza spp</i>) e <i>Tripes</i> (<i>Thrips spp</i>)	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações até às 6-8 folhas verdadeiras. I.S. 3 dias
NABIÇA <i>Lagartas</i> (<i>Noctuidae</i>)	20-25	I.S. 3 dias
PEPINO <i>Lagartas</i> (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis spp</i>)	20-25	I.S. 3 dias
PIMENTO <i>Tripes</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	20-25	I.S. 3 dias
RÚCULA RÚCULA SELVAGEM <i>Lagarta mineira das folhas</i> (<i>Liriomyza spp</i>) e <i>Tripes</i> (<i>Thrips spp</i>)	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações até às 6-8 folhas verdadeiras. I.S. 3 dias
SALSA <i>Lagarta mineira das folhas</i> (<i>Liriomyza trifolii</i>) e <i>Tripes</i> (<i>Thrips spp</i>)	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 3 aplicações. I.S. 3 dias
TATSOI KOMATSUNA MISUNA <i>Tripes</i> (<i>Thrips spp</i>) <i>Lagarta mineira das folhas</i> (<i>Liriomyza spp</i>)	20	I.S. 3 dias

Usos menores

Cultura	Dose cc/hl	Época de aplicação - I.S.
ANTÚRIO <i>Tripes</i> (<i>Thrips spp</i>)	20-25	
CRAVEIRO <i>Tripes</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips simplex</i>)	20-25	
GERBERA <i>Tripes</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	20-25	
ORQUÍDEAS <i>Tripes</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	20-25	
ROSEIRA <i>Tripes</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips flavus</i>)	20-25	

SPINTOR* 480 SC

Composição e Formulação:
Spinosade 480 g/l. Suspensão concentrada (SC)

Autorização de venda n.º 0288
concedida pela DGAV:
concedido à **Dow AgroSciences**

Classificação Toxicológica:
Perigoso para o ambiente



10ml 25ml 500ml



Lusosem[®]
produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins, n.º10-9ªA - 1495-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt
www.lusosem.pt



- As lagartas não lhe resistem
- Efeito de choque
- Elevada eficácia em escaravelho da batateira, acção sobre a traça
- Excelente controle de tripes
- Recomendado em Protecção Integrada e Agricultura Biológica



Dow AgroSciences

www.lusosem.pt
Lusosem[®]

SPINTOR^{*} 480 SC

EFICÁCIA NATURAL



Utilizações

Cultura	Dose cc/hl	Época de aplicação - I.S.
BATATA <i>Escaravelho da batateira</i>	50 - 75 cc/ha	Aplicar ao início do ataque repetindo, se necessário, a intervalos de 14 dias. I.S. 14 dias
TOMATE <i>Lagartas</i>	20-25	Tratar aos 1 ^{os} sintomas de ataque. Espaçar as aplicações 7-14 dias, intercalando com um produto de acção diferente (ex. Dursban 4). I.S. 3 dias
MACIEIRA E PEREIRA <i>Bichado da fruta</i>	20 - 25	Aplicar ao início de cada geração (eclosão dos ovos) repetindo, se necessário, a intervalos de 14 dias, e seguindo as indicações das estações de Serviços de Avisos ou as capturas em armadilhas com feromonas. I.S. 7 dias
PESSEGUEIRO <i>Anársia e Traça oriental do pessegueiro</i>	20 - 25	Aplicar ao início de cada geração (eclosão dos ovos) repetindo, se necessário, a intervalos de 14 dias, e seguindo as indicações das estações de Serviços de Avisos ou as capturas em armadilhas com feromonas. I.S. 7 dias
VINHA <i>Traça dos cachos</i>	10 - 12,5	Aplicar na altura da eclosão dos ovos ou ao aparecimento das 1 ^{as} larvas ou da verificação dos 1 ^{os} sinais de ataque da praga. Se necessário repetir a aplicação 7 a 14 dias após o 1 ^o tratamento. I.S. 14 dias



Usos menores

Cultura	Dose cc/hl	Época de aplicação - I.S.
ABOBORINHA <i>Lagartas (Spodoptera littoralis e Helicoverpa armigera)</i>	20-25	Horticultura de ar livre e estufa. I.S. 7 dias
ACELGA <i>Lagartas (Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis) Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 3 aplicações até às 6-8 folhas verdadeiras. I.S. 3 dias
AGRIÃO <i>Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 3 aplicações. I.S. 3 dias
AGRIÃO DE ÁGUA <i>Lagartas (Spodoptera littoralis e Helicoverpa armigera) e Mosca mineira (Hydrellia pubescens)</i>	25	Horticultura de ar livre. Máx. 3 aplicações. I.S. 3 dias
ALFACE <i>Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações até às 6-8 folhas verdadeiras. I.S. 3 dias
ALHO PORRO <i>Tripes (Frankliniella occidentalis)</i>	20-25	Horticultura de ar livre I.S. 7 dias
AMORA <i>Tripes (Frankliniella occidentalis, Thrips spp)</i>	20	I.S. 3 dias
BERINGELA <i>Lagartas (Spodoptera littoralis)</i>	20-25	Horticultura de ar livre e estufa. I.S. 3 dias
CEBOLINHO <i>Tripes (Frankliniella occidentalis)</i>		Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações. I.S. 3 dias



Usos menores

Cultura	Dose cc/hl	Época de aplicação - I.S.
CEREFÓLIO <i>Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações. I.S. 3 dias
COENTROS <i>Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 3 aplicações. I.S. 3 dias
COUVE-BRÓCOLO COUVE-FLORES COUVE-REPOLHO COUVE-FRISADA COUVE-DE-BRUXELAS COUVE-CHINESA (PAK-CHOI) <i>Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações até às 6-8 folhas verdadeiras. I.S. 3 dias
COUVE-BRÓCOLO COUVE-FLORES COUVE-REPOLHO COUVE-FRISADA Mosca da couve ou bicho-arroz (Delia radicum)	40cc/5L	Aplicar, sobre as jovens plantas em tabuleiro, antes da plantação.
ESPINAFRE <i>Lagartas (Spodoptera littoralis e Helicoverpa armigera) Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp.)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 2 aplicações até às 6-8 folhas verdadeiras. I.S. 3 dias
FRAMBOESA <i>Tripes (Frankliniella occidentalis)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. I.S. 3 dias
HORTELÃ <i>Lagarta mineira das folhas (Liriomyza trifolii) e Tripes (Thrips spp)</i>	20	Horticultura de ar livre e protegida. Máx. 3 aplicações. I.S. 3 dias
MELÂNCIA <i>Lagartas (Spodoptera littoralis e Helicoverpa armigera)</i>	20-25	Horticultura de ar livre e estufa. I.S. 3 dias