

SUCESSO RECONHECIDO



Broadway[®]
HERBICIDA

O novo anti-gramíneas para trigo.

Elevada eficácia contra folhas estreitas
e folhas largas num só produto.

O herbicida completo.

Distribuído por:

www.lusosem.pt

 **Lusosem**[®]
produtos para agricultura, S.A.



Dow AgroSciences

Soluções para um Mundo em Crescimento

Finalmente ao seu dispor. O bilhete para o seu sucesso!



Broadway[®]

HERBICIDA

Para o controlo das infestantes de folha estreita e folha larga da cultura do trigo

Broadway* é um herbicida de pós-emergência selectivo para trigo que possui uma elevada eficácia no controlo de gramíneas como **Alopecurus**, **Avena**, **Bromus**, **Lolium** e **Phalaris**, e um amplo espectro de controlo sobre infestantes de folha larga como **Galium**, **Veronica**, **Raphanus**, **Sinapis**, **Matricaria**, **Papaver**, **Polygonum**, **Stellaria**, entre outras.

Composição química

Grânulos dispersíveis em água (WG): 2,3 % (p/p) de florasulame, 6,8 % (p/p) de piroxsulame e 6,8 % (p/p) de cloquintocete-mexilo.

Culturas autorizadas

Broadway* pode ser utilizado em todas as variedades de trigo duro e de trigo mole.

Principais infestantes susceptíveis

Monocotiledóneas: Rabos-de-raposa (*Alopecurus myosuroides*); balancos (*Avena* spp.); Bromo-mole (*Bromus* spp.; *Bromus sterilis*); azevéns (*Lolium* spp.); erva-cabecinha (*Phalaris minor*).

Dicotiledóneas: amor-de-hortelão (*Galium aparine*), verónicas (*Veronica* spp.), saramago (*Raphanus raphanistrum*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), camomila (*Matricaria* spp.), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), morugem-branca (*Stellaria media*), pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*) andragem (*Ridolfia segetum*).

Dose de aplicação

Aplicar **Broadway*** em pulverização normal na dose de **275 g de produto por hectare**, diluído em 200 litros de água por hectare.

Com o objectivo de melhorar a eficácia do tratamento, deverá ser adicionado à calda do herbicida um molhante autorizado para utilização em mistura com herbicidas na cultura do trigo.

Época e modo de aplicação

O **Broadway*** é um herbicida de pós-emergência que pode ser aplicado em trigo desde o estado de três folhas (BBCH 13) até ao início do encanamento (BBCH 32), com os estados B21 e B23 da cultura (início do afilhamento) como momento óptimo para o controlo das infestantes. O crescimento das infestantes é interrompido depois da aplicação e os primeiros sintomas aparecem entre 5 a 10 dias depois do tratamento, sendo a eficácia máxima obtida 6 a 8 semanas depois da aplicação.

Observações

Pode ser aplicado em condições de frio (5° C) e com uma ampla janela de aplicação.



Dow AgroSciences

© Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

Distribuído por:

www.lusosem.pt



produtos para agricultura, S.A.