

**Dose:**  
**0,75 a 1 litros/ha tratado.**

**Precauções:**  
Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6°C.  
Aplicar com as infestantes em crescimento activo.

**Culturas Homologadas:**  
Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.

---

**Starane\*20**  
Marca Registada de Dow Agrosciences AV nº 0156  
Concentrado para emulsão (EC) com 20,6% de fluroxipir.  
Classificação toxicológica: Nocivo (Xn), Perigoso (N)

---

Distribuído por:

 **Lusosem**<sup>®</sup>  
*produtos para agricultura, S.A.*

Rua General Ferreira Martins, nº10-9ª - 1495-137 ALGÉS  
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: [lusosem@lusosem.pt](mailto:lusosem@lusosem.pt)  
[www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

O herbicida nº1 no controlo de GALIUM nos seus cereais

**Com STARANE 20**  
**não existem**  
**ervas difíceis**  
**nos cereais**

 **Dow AgroSciences**



1

## STARANE\* 20

É o melhor herbicida de pós-emergência para o controlo de infestantes dicotiledóneas como o Raspa-saias (*Galium aparine*) em cereais. Controla também outras infestantes difíceis.

2

Controla também:

**Sempre-Noiva**

(*Polygonum aviculare*)

**Labaças** (*Rumex spp.*)

**Malvas** (*Malva spp.*)

**Mostarda-dos-campos**

(*Sinapis arvensis*)

**Morugem-branca**

(*Stellaria media*)

**Urtiga-branca**

(*Lamium aplexicaule*)

**Parietárias** (*Parietaria spp.*)

**Urtigas** (*Urtica spp.*)

**Corriola** (*Convolvulus arvensis*)



3

**Sistemias ascendente e descendente**

controla a totalidade da infestante, até à raiz e posteriores renovos.



4

**Ação rápida.**

O seu efeito é visível poucas horas após a aplicação do produto.

5

**Selectivo para todas as variedades de trigo e cevada.**

6

**Fácil de misturar com outros herbicidas, habitualmente utilizados nos cereais.**

7

8

\*Starane e Piton Verde são marcas registadas de Dow AgroSciences

**Dose:**

**1,5 litros/ha tratado.**

Ajustar esta dose à superfície realmente tratada,  
quando se aplica em faixas ou zonas.

Dose para pulverizador de dorso: 50 a 100 cc por máquina (10 L).

**Precauções:**

Não aplicar em árvores com menos de 4 anos. Não pulverizar os ramos e folhas  
mais baixas das árvores. Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6°C.

Aplicar com as infestantes em crescimento activo.

**Culturas Homologadas:**

Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.

---

**Starane\*20**

Marca Registada de Dow Agrosciences AV nº 0156  
Concentrado para emulsão (EC) com 20,6% de fluroxipir.  
Classificação toxicológica: Nocivo (Xn), Perigoso (N)

---

Distribuído por:



Rua General Ferreira Martins, nº10-9ª - 1495-137 ALGÉS  
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt  
[www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

o melhor herbicida para combater as MALVAS E CONYZAS

**Com STARANE 20**  
**não existem**  
**ervas difíceis**  
**nos citrinos**

Dow AgroSciences



## STARANE\* 20

É o melhor herbicida de pós-emergência para o controlo de *Conyza sp.*, *Malva spp.* e outras infestantes.

É totalmente eficaz com as infestantes mais difíceis, e é totalmente selectivo para os Citrinos.

1

Excelente controlo de Malvas e Avoadinha (*Conyza sp.*).

2

Controla também:

**Saramago**

(*Raphanus sp.*)

**Morugem-branca**

(*Stellaria media*)

**Corriola**

(*Convolvulus arvensis*)

**Beldroega**

(*Portulaca oleracea*)

**Pepino-de-São-Gregório**

(*Ecbalium sp.*)

**Urtigas** (*Urtica spp.*)

**Malvão** (*Abutilon theophrasti*)

**Parietárias** (*Parietaria spp.*)

3

Controla a totalidade da infestante até à raiz e posteriores renovos.

SISTEMIA ASCENDENTE E DESCENDENTE.



4

**Ação rápida.**

O seu efeito é visível poucas horas após a aplicação do produto.

5

**Selectivo para todas as espécies de Citrinos.**

6

**Fácil de misturar com outros herbicidas,** como **Piton Verde\*** (glifosato), obtendo como resultado o controlo de todas as infestantes.

7

**Fácil de aplicar.**

Com os equipamentos de pulverização habitualmente utilizados nos Citrinos.

8

**Económico.**

Em mistura, poderá reduzir-se a dose de **Piton Verde\*** (glifosato). Contactar serviços técnicos da Lusosem.

\*Starane e Piton Verde são marcas registadas de Dow AgroSciences



**Dose:**

**1,5 litros/ha tratado.**

Ajustar esta dose à superfície realmente tratada,  
quando se aplica em faixas ou zonas.

**Dose para pulverizador de dorso: 50 a 100 cc por máquina (10 L).**

**Precauções:**

Não aplicar em árvores com menos de 4 anos.

Não pulverizar os ramos e folhas mais baixas das pomóideas.

Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6°C. Aplicar com as infestantes em crescimento activo.

**Culturas Homologadas:**

Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.

---

**Starane\*20**

Marca Registada de Dow Agrosciences AV nº 0156  
Concentrado para emulsão (EC) com 20,6% de fluroxipir.  
Classificação toxicológica: Nocivo (Xn), Perigoso (N)

---

Distribuído por:



Rua General Ferreira Martins, nº10-9ºA - 1495-137 ALGÉS  
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: [lusosem@lusosem.pt](mailto:lusosem@lusosem.pt)  
[www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

o melhor herbicida para o controlo de MALVAS, LABAÇAS e CORRIOLA

**Com STARANE 20**  
**não existem**  
**ervas difíceis**  
**nas pomóideas**

The logo for Dow AgroSciences, featuring a stylized green globe icon to the left of the text "Dow AgroSciences" in a bold, black, sans-serif font.

**Dow AgroSciences**

## STARANE\* 20

É o melhor herbicida de pós-emergência para o controlo de Malvas, Labaças, Corriola e outras infestantes dicotiledóneas.

É totalmente eficaz com as infestantes mais difíceis, e é totalmente selectivo para as pomóideas

1

Excelente controlo de Malvas (*Malva spp.*), Labaças (*Rumex spp.*) e Corriola (*Convolvus arvensis*).

2

Controla também:

**Avoadinha**  
(*Conyza sp.*)

**Beldroega**  
(*Portulaca oleracea*)

**Raspa-saias**  
(*Galium aparine*)

**Morugem-branca**  
(*Stellaria media*)

**Urtigas** (*Urtica spp.*)

**Parietárias** (*Parietaria spp.*)

3

**Sistemias ascendente e descendente**

Controla a totalidade da infestante, até à raiz e posteriores renovos.



4

**Ação rápida.**

O seu efeito é visível poucas horas após a aplicação do produto.

5

**Selectivo para todas as espécies de Pomóideas.**

6

**Fácil de misturar com outros herbicidas,** como **Piton Verde\*** (glifosato), obtendo como resultado o controlo de todas as infestantes do pomar.

7

**Fácil de aplicar.**

Com os equipamentos de pulverização habitualmente utilizados nas Pomóideas.

8

**Económico.**

Nas misturas, com **Piton Verde\*** (glifosato), pode-se reduzir a dose deste (contactar os serviços técnicos da Lusosem).

\*Starane e Piton Verde são marcas registadas de Dow AgroSciences

**Dose:**  
**0,75 a 1 litro/ha.**

**Momento de aplicação:**  
Das 3 às 5 folhas do milho

**Precauções:**  
Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6°C.  
Aplicar com as infestantes em crescimento activo.

**Culturas Homologadas:**  
Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.

---

**Starane\*20**

Marca Registada de Dow Agrosciences AV nº 0156  
Concentrado para emulsão (EC) com 20,6% de fluroxipir.  
Classificação toxicológica: Nocivo (Xn), Perigoso (N)

---

Distribuído por:

 **Lusosem**<sup>®</sup>  
*produtos para agricultura, S.A.*

Rua General Ferreira Martins, nº10-9ªA - 1495-137 ALGÉS  
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt  
[www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

*o melhor herbicida para combater o MALVÃO e CORRIDA*

**Com STARANE 20**  
não existem  
ervas difíceis  
no milho

 **Dow AgroSciences**



1

## STARANE\* 20

É o melhor herbicida de pós-emergência para o controlo das infestantes mais difíceis, inclusivamente as resistentes e é totalmente selectivo para o milho.

Excelente controlo de Malvão (*Abutilon theophrati*) e Corriola (*Convolvulus arvensis*).

2

Controla também:

**Beldroega**

(*Portulaca oleracea*)

**Sempre-Noiva**

(*Poligonum aviculare*)

**Figueira-do-inferno**

(*Datura stramonium*)

**Erva-moira**

(*Solanum nigrum*)

**Labças** (*Rumex spp.*)

**Malvas** (*Malva spp.*)

**Amor-de-hortelão**

(*Galium aparine*)

**Urtiga-branca** (*Lamium amplexicaule*)

**Parietárias** (*Parietaria spp.*)



3

**Sistemia ascendente e descendente**

Controla a totalidade da infestante até à raiz e posteriores renovos.

4

**Acção rápida.**

O seu efeito é visível poucas horas após a aplicação do produto.

5

**Selectivo para o milho.**

6

**Fácil de misturar.**

Boa compatibilidade em mistura com a maioria dos herbicidas homologados para a cultura do milho.