

10L



in Boro - Ultra

AE03714

NUTRIÇÃO BORO

Formulado para aplicação foliar

Boro etanolamina
com co-formulantes

GIRASSOL
BETERRABA
COLZA
ERVILHA
HORTICOLAS, FRUTEIRAS
E KIWI
VINHA

in
NUTRITION

Na essência do crescimento



DE SANGOSSE



Boro - Ultra

ADUBO CE

AE03715

MISTURA DE MICRO-NUTRIENTES

Boro (B, etanolamina) e Molibdénio (Mo, amónio)

10,9 % Boro solúvel em água (B) (150 g/L)

0,02 % Molibdénio solúvel em água (Mo) (0,28 g/L)

Utilização em caso de carência.

Respeitar as doses recomendadas.

APLICAÇÃO AO SOLO

APLICAÇÃO AO SOLO – todas as culturas - Dose: 8-10 L/ha – Época de aplicação: Antes da sementeira ou plantação

APLICAÇÃO FOLIAR

Principais Culturas	Dose/ha	Concentração Máxima	Épocas de aplicação
GIRASSOL	3L/ha	200L/ha min	2 aplicações desde os 5 pares de folhas até pré-floração
BETERRABA			2 aplicações durante o arranque e na cultura estabelecida
COLZA			1-2 aplicações desde as 2-3 folhas até início da floração
ERVILHA	2L/ha	600L/ha min	1-2 aplicações desde as 5-6 folhas até início da floração
HORTICOLAS, FRUTEIRAS E KIWI			1-2 aplicações com a cultura bem estabelecida ou antes e depois da floração
VINHA	2L/ha	500L/ha min	Ao cacho visível, floração e final da floração

Conselhos de aplicação

Para obter melhores resultados, use água suficiente para atingir uma cobertura uniforme da planta até o ponto de escorrimento. Evitar a pulverização em condições de grande intensidade de luz solar e / ou temperaturas muito altas. Se possível, aplique durante a noite ou às primeiras horas do dia, especialmente se as temperaturas diurnas excederem os 28 ° C. Folhagem muito jovem e culturas sob stresse podem ser mais suscetíveis a queimaduras. Doses mais baixas devem ser aplicadas nestas circunstâncias e o intervalo de aplicação reduzido em conformidade. Consulte as recomendações de cultura no rótulo para doses e épocas de aplicação para cada cultura.

MISTURA

1. Encher o pulverizador com metade da quantidade de água pretendida e agitar.
2. Adicionar a quantidade necessária de INO-BORO e encher o pulverizador, mantendo a agitação. Quando aplicado com outros produtos, adicionar o INO-BORO sempre em último. Não permitir que a mistura se mantenha sem agitação.
3. Após pulverização, limpe e armazene o equipamento em segurança.

ARMAZENAMENTO

Armazenar na embalagem original, fora da luz solar direta, bem fechada, em lugar seguro longe de crianças, animais e géneros alimentícios. Armazenar fora do frio.

ELIMINAÇÃO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA RELATIVOS A SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS

Não deixar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas de dados de segurança. Tripla lavagem. Não queime. Não utilize as embalagens para qualquer outra finalidade.

O fabricante garante a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor.

Nenhuma garantia é dada da utilização deste material e nenhuma responsabilidade aceite por algum dano ou prejuízo resultantes do armazenamento, manuseamento, aplicação ou utilização deste produto.

P102 - Manter for a do alcance das crianças.

P103 - Ler o rótulo antes da aplicação.

P234 - Conservar unicamente no recipiente de origem.

P262 - Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em locais/empresas autorizadas de acordo com a regulamentação nacional.

10 L

PESO LÍQUIDO

13,7 kg



Lusosem
produtos para agricultura, S.A.

Distribuidor : LUSOSEM - R. General Ferreira Martins, n° 10 - 9ªA 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242 - lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

Fabricado por : DE SANGOSSE «Bonnef» - BPS - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE- Tél: 05.53.69.36.30



Na essência do crescimento