


HERBICIDA

sistémico, de pós-emergência
para o controlo das milhãs (*Echinochloa* spp)
na cultura de arroz.

Controla também
graminhão
(*Paspalum paspalodes*)
e *Leptochloa*.

**Cialofope-butilo 200g/l
Concentrado para emulsão (EC)**

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Problema	Dose	Época de aplicação	PI
Arroz	Infestantes Milhã-pé-de-galo <i>(Echinochloa crus-galli)</i> Milhã-do-arroz <i>(Echinochloa oryzoides)</i> Milhã-peluda <i>(Echinochloa phyllopogon)</i>	1,5 l/ha (em mistura com um molhante não iónico à dose recomendada no rótulo)	Aplicar em pós-emergência das milhãs quando a maioria tiver entre 1 a 3 folhas. No momento de aplicação os canteiros devem encontrar-se drenados ou com um nível de água que não ultrapasse 1 cm, de modo a assegurar uma exposição máxima das infestantes. Pode ser aplicado por meios terrestres ou aéreos, desde que se consiga uma pulverização adequada e uniforme de todas as infestantes*	PROTEÇÃO INTEGRADA 

*O Volume de calda a utilizar é de 200-400l/ha (aplicação terrestre) e de 100l/ha (aplicação aérea)

SELECTIVIDADE

CLINCHER aplicado na dose recomendada, é totalmente selectivo para a cultura do arroz, tanto em sementeira directa como em transplantação, e em todas as variedades (japónica e índica).

MODO DE ACÇÃO

CLINCHER é um herbicida de pós-emergência, sistémico, de muito rápida absorção pelas folhas e caules das infestantes. Uma hora depois da aplicação, o produto é absorvido pela planta e 8 horas após a aplicação, está totalmente distribuído por todos os seus tecidos.

A partir desse momento cessa o crescimento da *Echinochloa* terminando a sua concorrência com a cultura.


Os primeiros sintomas tornam-se visíveis aos 2/3 dias depois da aplicação e as plantas morrem completamente ao fim de duas semanas.



MANEIO DA ÁGUA

Antes da aplicação de **CLINCHER**, esvaziar a água do canteiro; poderá ficar um resto de água desde que as folhas da *Echinochloa* fiquem por cima da superfície da mesma, de modo a estarem expostas à pulverização do produto.

A seguir à aplicação, manter o canteiro sem água durante 24 horas. A partir desse momento voltar a inundar o canteiro até alcançar o nível normal para a cultura.



COMPATIBILIDADE

A mistura de **CLINCHER** com os insecticidas homologados para a cultura do arroz, não reduz a eficácia nem representa nenhum risco de incompatibilidade. Para outro tipo de misturas recomendamos a consulta aos Serviços Técnicos da Dow Agrosciences.

VANTAGENS

- Máxima eficácia no controlo das milhãs (*Echinochloa* spp)
- Total Selectividade para a cultura do arroz
- Fácil maneo da água
- Recomendado em Protecção Integrada

PROTECÇÃO INTEGRADA



CLINCHER* Marca registada Dow AgroSciences - AV nº0016
Concentrado para emulsão (EC) com 200g/l de Cialofope-butilo



Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.



Rua General Ferreira Martins, nº10-9ª - 1495-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt
www.lusosem.pt