

DEFINITIVO!

Contra a moniliose da amendoeira

Autorização de venda:

Nº 1050 concedida pela DGAV

Formulação:

Emulsão óleo em água (EW) com 50 g/L ou 4,95% (p/p) de fenebuconazol

Intervalo de segurança:

120 dias em amendoeira

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.



- Novo produto em amendoeira com um modo de ação exclusivo
- Ação complementar em mancha ocre
- Sistémico, preventivo e curativo
- Alta persistência e resistência à lavagem
- Seletivo
- Compatível com abelhas e insetos úteis
- Excelente perfil eco-toxicológico
- Polivalente: controla numerosas doenças em várias culturas como Olival e Vinha

Indar[®]5EW

FUNGICIDA



Dow AgroSciences

®Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

Distribuído por:

 **Lusosem[®]**
produtos para agricultura, S.A.

lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt



Dow AgroSciences

Soluções para um Mundo em Crescimento

 **Lusosem[®]**
produtos para agricultura, S.A.

www.lusosem.pt

Indar[®]5EW

FUNGICIDA

Nova formulação


Indar 5EW é um novo fungicida para o controle da moniliose da amendoeira com acção complementar em mancha ocre.

Polivalente, controla também oídio da videira; pedrado da macieira, pereira, marmeleiro e pêra-nashi; oídio e moniliose do pessegueiro, nectarina, ameixeira, cerejeira e damasqueiro; oídio do meloeiro, melancia, pepino, abóbora e courgette; olho de pavão da oliveira

Modo de acção exclusivo

Indar 5EW possui um novo modo de acção em amendoeira, que inclui dois efeitos nos órgãos vegetais:

- **Sistémico:**
 - O produto penetra no interior da planta deslocando-se para os tecidos adjacentes.
 - Elimina o micélio interno.
- **Forte fixação às ceras da planta:**
 - Protecção prolongada e grande resistência à lavagem.




Tratamentos preventivos com Indar 5EW

Indar 5EW é muito eficaz contra a moniliose da amendoeira, especialmente de um modo preventivo, mas também possui acção curativa sobre o micélio interno.


A moniliose afecta de forma grave e frequente a amendoeira, especialmente em condições de humidade. Provoca murchidão de flores e mumificação dos frutos, afetando diretamente a produção da colheita. Por esta razão é muito importante realizar tratamentos com Indar 5EW de forma preventiva, especialmente durante a floração.

Os resultados de ensaios realizados pela Dow AgroSciences com a IRTA* demonstram que a utilização de Indar 5EW permite obter mais 35-40% de amêndoa por hectare em relação a uma zona não tratada.



*IRTA: Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias

Estratégia de controle de moniliose em amendoeira



Para um ótimo controle de moniliose recomenda-se realizar com Indar 5EW dois tratamentos preventivos em floração (momento crítico da doença):

- 1ª aplicação no começo da floração, desde o botão floral até 20% de flores abertas.
- 2ª aplicação desde 80% de flores abertas até às quedas das pétalas, com um intervalo mínimo de 7 dias.

Indar 5EW também pode ser utilizado em outras fases do ciclo. No entanto, com um **intervalo de segurança de 120 dias**, é aconselhável a sua utilização na floração pelo impacto da doença nesta fase crucial.

Vantagens de utilização

- Novo produto em amendoeira com um modo de acção exclusivo**
- Preventivo e curativo**
- Totalmente seletivo**
- Definitivo no controle de moniliose**
- Alta persistência e resistência à lavagem**
- Compatível com abelhas e insetos úteis**
- Sistémico**
- Formulação otimizada**
- Excelente perfil eco-toxicológico**