

DEFINITIVO!

Controla numerosas doenças em várias culturas



Autorização de venda:
Nº 1050 concedida pela DGAV

Formulação:
Emulsão óleo em água (EW) com 50 g/L ou 4,95% (p/p) de fenbuconazol

Intervalo de segurança: não aplicável

O **INDAR 5 EW** é um fungicida para o combate ao pedrado da macieira, pereira, marmeleiro e pêra-nashi; oídio e moniliose do pessegueiro, nectarina, ameixeira, cerejeira e damasqueiro; moniliose da amendoeira e oídio do meloeiro, melancia, pepino, abóbora e courgette; olho-de-pavão da oliveira e oídio da videira.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.



- Novo produto em Fruteiras
- Sistémico, preventivo e curativo
- Alta persistência e resistência à lavagem
- Seletivo
- Compatível com abelhas e insetos úteis
- Excelente perfil eco-toxicológico
- Polivalente: controla numerosas doenças em várias culturas, como vinha e olival

Indar[®]5EW

FUNGICIDA



®Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

Distribuído por: 
Lusosem[®]
produtos para agricultura, S.A.
lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

 **Dow AgroSciences**
Soluções para um Mundo em Crescimento


Lusosem[®]
produtos para agricultura, S.A.
www.lusosem.pt

Indar[®]5EW

FUNGICIDA

Nova formulação

Indar 5EW é uma nova formulação fungicida para o controle da moniliose, oídio e pedrado em várias culturas.

Novas culturas

Indar 5EW tem uma gama maior de usos registrados, trazendo novas soluções em diversas doenças.

NOVAS DOSES


NOVO AMENDOEIRA	Moniliose	1,5 L/ha máx.	NOVO Oídio	UVA DE MESA UVA PARA VINIFICAÇÃO
NOVO CEREJEIRA			NOVO Oídio	CUCURBITÁCEAS
NOVO AMEIXEIRA	Moniliose e Oídio		NOVO Pedrado	MARMELO E NASHI
NOVO PESSEGUEIRO AMEIXEIRA DAMASQUEIRO				POMÓIDEAS
		0,75 L/ha máx.		
		1 L/ha		

Modo de ação exclusivo

Indar 5EW possui uma alta proteção preventiva além de uma ação curativa sobre o fungo em fase de incubação. Possui um modo de ação próprio, com características únicas dentro dos fungicidas do seu grupo:

- **Forte fixação às ceras da planta:**
 - Proteção prolongada e grande resistência à lavagem.
 - Ideal para a proteção de frutos
- **Sistêmico:**
 - O produto penetra no interior da planta deslocando-se para os tecidos adjacentes.
 - Distribui-se nas folhas com um movimento translaminar.
 - Indar 5EW acede ao micélio interno bloqueando o seu desenvolvimento quando se encontra na fase de desenvolvimento.

Para um controle ótimo recomenda-se realizar aplicações preventivas



Estratégia de controle recomendada

Cultura	Doença	Botão	Floração	Queda das pétalas	Vingamento	Frutos em crescimento	Maturação completa	Intervalo segurança	Tratamento ótimo
Amendoeira	Moniliose							120 dias	Duas aplicações desde o início da floração até à queda das pétalas. Possibilidade de utilizar o produto depois, no entanto é preferível o seu uso em floração pelo impacto da doença nesta fase.
Pessegueiro, nectarinas, ameixeira e damasqueiro	Moniliose							3 dias	Aplicações em floração e maturação, realizando o último tratamento três dias antes da colheita para obter um controle prolongado até depois da colheita.
	Oídio								Aplicações desde a queda das pétalas até ao vingamento
Cerejeira	Moniliose							3 dias	Aplicações em floração, antes do vingamento e na maturação realizando o último tratamento três dias antes da colheita para obter um controle prolongado até depois da colheita.
	Oídio								Aplicações desde a queda das pétalas até ao vingamento
Macieira, pereira, marmelo e nashi	Pedrado							28 dias	Aplicar desde a floração, até 50% do tamanho do fruto. É decisivo aplicar preventivamente desde a brotação para controlar as infeções primárias.
VINHA	Doença	Folhas soltas	Cachos visíveis	Floração	Bago de chumbo	Bago de ervilha	Fecho dos cachos	Intervalo segurança	Tratamento ótimo
Uva de mesa e para vinificação	Oídio							28 dias	
CUCURBITÁCEAS	Doença	3 Folhas	Crescimento vegetativo	Floração	Crescimento dos frutos		Maturação	Intervalo segurança	Tratamento ótimo /aplicações)
Cucurbitáceas	Oídio							3 dias	

Vantagens de utilização

- **Novo produto com um modo de ação exclusivo**
- **Preventivo e curativo**
- **Totalmente seletivo**
- **Definitivo no controle de olho-de-pavão**
- **Alta persistência e resistência à lavagem**
- **Compatível com abelhas e insetos úteis**
- **Sistêmico**
- **Formulação otimizada**
- **Excelente perfil eco-toxicológico**