

Volume : 1L e



ADJUVANTE DE USO AGRÍCOLA

**Produto para ser adicionado
às caldas dos produtos fitofarmacêuticos
(herbicidas e reguladores de crescimento das plantas).**

Emulsão óleo em água com 355 g/l
ou 35% (p/p) de lecitina de soja.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS
E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Autorização provisória de venda n° 4010 concedida pela DGAV.

Lote n° : vide embalagem



DE SANGOSSE

DE SANGOSSE S.A.S.

BP 5 - ZI Bonnel - 47480 PONT-DU-CASSE - FRANCE
Tel: 00 33 (0)5 53 69 36 30 - Fax: 00 33 (0)5 53 66 30 65
agridyne@agridyne.fr - www.agridyne.com - www.desangosse.com

 **Lusosem**[®]
produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins
n° 10-9°A - 1495-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242 - Fax: 214 131 284
lusosem@lusosem.pt - www.lusosem.pt

MODO DE ACÇÃO

O **LI 700** permite melhorar significativamente a dispersão e a penetração dos produtos fitofarmacêuticos aos quais se encontra associado na superfície das plantas, sem alterar a sua selectividade. O **LI 700** optimiza a eficácia dos tratamentos mesmo em condições climáticas pouco favoráveis ou sobre plantas de difícil molhabilidade.

Na concentração recomendada o **LI 700** aumenta o diâmetro médio das gotículas, reduzindo assim os riscos de arrastamento sobre as culturas vizinhas ou ambiente.

UTILIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO

Concentração: 500 ml/ha (0,5 %)

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária e por o sistema de agitação em funcionamento. Juntar o adjuvante **LI 700** e a seguir a quantidade do produto fitofarmacêutico a utilizar. Completar o volume de água, agitando sempre. Manter o sistema de agitação em funcionamento. Utilizar a calda imediatamente após a preparação.

PRECAUÇÕES GERAIS

- O **LI 700** deve ser armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura superior a 5° C.

- O **LI 700** não deve ser utilizado com caldas muito ácidas, visto poder coagular abaixo de pH 3.

Nota: Como a aplicação não é feita sob o nosso controlo, apenas nos responsabilizamos pela qualidade sempre constante dos nossos produtos. Toda a responsabilidade pela eficácia e/ou fitotoxicidade deve ser assumida pelo aplicador.



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues

num centro de recepção do sistema Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



Perigo

H315: Provoca irritação cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

SP1: Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Período de reentrada:

24 horas no mínimo, após o fim da pulverização.

DE SANGOSSE S.A.S.

BP 5 - ZI Bonnel

47480 PONT-DU-CASSE - FRANCE

Tel: 00 33 (0)5 53 69 36 30

Fax: 00 33 (0)5 53 66 30 65

www.agridyne.com - www.desangosse.com



ADJUVANTS **AgriDyne**[®]
Accélérateurs de performances