



ATENÇÃO

- Ficha de segurança fornecida a pedido (EUH210).
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea (H317).
- Provoca irritação ocular grave (H319).
- Suspeito de afetar o nascituro (H361).
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H410).
- Não respirar a nuvem de pulverização (P260).
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto (P270).
- Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas e equipamento protector para os olhos/face durante a preparação da calda e aplicação do produto (P280).
- Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objetos contaminados. Em caso de usar luvas, lavá-las também por dentro.
- Eliminar a embalagem em locais adequados à recolha de resíduos perigosos (P501).
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem (SP1).
- Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície (SPe3a).

Intervalo de Segurança – 28 dias em vinha.

Tratamento de emergência: • SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes (P302+P352). • SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar (P305+P351+P338). • EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico (P308+P313).

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TELEF: 808 250 143



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



ARITHANE é um fungicida anti-oidio com actividade preventiva e curativa
Suspensão concentrada (SC) com 45 g/L ou 4,12% (p/p) de miclobutanil e 45 g/L ou 4,12% (p/p) de quinoxifena

Conteúdo: 1 Le

Data de fabrico e lote: ver embalagem

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÉUTICO LEIA O RÓTULO



Distribuído por :

Rua General Ferreira Martins, n.º 10 9.º A
1495-137 Algés
Tel: 21 413 12 42 - Fax: 21 413 12 84
lusosem@lusosem.pt - www.lusosem.pt

Autorização provisória de venda n.º 3960
concedida pela DGAV:
Dow AgroSciences Ibérica S.A.
C/ Ribera del Loira 4-6, 4.ª planta
28042 MADRID - ESPANHA
Tel.: +34 91 740 77 00

O **ARITHANE®** é um fungicida com actividade preventiva e curativa para o controlo do oídio da videira. O produto é composto por duas substâncias activas de diferente modo de acção, a quinoxifena pertencente ao grupo das quinolininas e que possui actividade preventiva, e o miclobutanil, triazol que inibe a demetilação na biossíntese dos esteróis (DMI) e que possui actividade preventiva e curativa.

UTILIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO

Oídio da vinha: 100-125 ml/hL. As concentrações indicadas destinam-se a aplicações a alto volume, o que corresponde a aplicar por hectare e no pleno desenvolvimento vegetativo, as doses de

1 L/ha – 1,25 L/ha respectivamente.

Seguir as indicações do Serviço de Avisos, caso existam. Na sua ausência iniciar as aplicações no estado de cachos visíveis e **continuar até ao fecho dos cachos**, efectuando no **máximo 3 aplicações** com este ou outros fungicidas do grupo dos DMI e das quinolininas. A persistência biológica do produto é de 14 dias. Os restantes tratamentos devem ser efectuados com produtos fitofarmacêuticos com diferente modo de acção. Utilizar a dose máxima em caso de forte intensidade da doença. Pulverizar bem as partes das plantas a proteger.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar este fungicida nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicações repetidas do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (DMI e quinolininas).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

As concentrações atrás indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada de tal modo que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.

COMPATIBILIDADES

O ARITHANE é compatível com a maioria dos fungicidas, insecticidas e acaricidas utilizados em vinha.

Durante a armazenagem manter o produto em local seco e fresco.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

© Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow Edição CLP1