

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

- Ficha de segurança fornecida a pedido (EUH210).
- Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica (EUH208).
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H410).
- Não respirar a nuvem de pulverização (P260).
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa (P262).
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto (P270).
- Recolher o produto derramado (P391).
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos (P501).
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem (SP1).
- Em pomares de macieira e pereira, para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 m em relação às águas de superfície (Spe3).
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície (Spe3).
- No caso de aplicações aéreas tomar em consideração os aspetos inerentes a esta técnica de aplicação, de modo a não contaminar as zonas circunvizinhas da área a tratar (SPePT3).

Tratamento de emergência:

- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo (P101).
- EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico (P301+P310).

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TELEF: 808 250 143



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda

© Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow.



Cent-7®

HERBICIDA

Suspensão concentrada (SC)

com 125 g/l ou 12,1% (p/p) de isoxabena

Herbicida residual para controlar dicotiledóneas anuais nas culturas dos cereais, vinha, macieira e pereira

Data de fabrico e lote: ver embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÉUTICO LEIA O RÓTULO

Conteúdo: 1 L e

Autorização provisória de venda n°2350 concedida pela DGAV:
Dow AgroSciences Ibérica S.A.
C/ Ribera del Loira 4-6; 4ª planta
28042 MADRID-ESPAÑA
Tel.: +34 91 740 77 00

O Cent-7® é um herbicida de absorção radicular, indicado para controlar dicotiledóneas anuais nas seguintes culturas:

Cultura	Dose / ha		Aplicações
	Produto	Calda	
Vinha Macieira Pereira	6 a 8 l	400 l a 800 l	- A partir da plantação e durante o repouso vegetativo das culturas. - Em pré-emergência das infestantes. - O terreno deve estar limpo de infestantes, bem preparado, sem torrões e se possível com alguma humidade.
Trigo Cevada Aveia Centeio Triticale	1 l	400 l a 800 l	- Em pré-emergência das culturas. - A aplicação deve ser feita a seguir à sementeira, normalmente 4-5 dias após esta. - O terreno deve estar bem preparado, sem torrões com humidade à superfície e a semente bem enterrada. Em caso de aplicação por via aérea, a dose de calda é de 50-100 litros/hectare.

O Cent-7 é absorvido pelas radículas das infestantes inibindo os seus primeiros estados de desenvolvimento. Provoca o entumescimento das zonas meristemáticas, seguida de necrose e morte das infestantes. Actua principalmente por inibição da síntese proteica nas plantas.

Infestantes susceptíveis

Pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), junco-dos sapos (*Juncus bufonius*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), patalco (*Ranunculus arvensis*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), amor-perfeito-bravo (*Viola arvensis*), esparguta (*Spergula arvensis*), urtiga-menor (*Urtica urens*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), verónicas (*Veronica* spp.).

Infestantes moderadamente susceptíveis

Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*).

Infestantes resistentes

Todas as gramíneas e ainda agulha-do-pastor (*Scandix pecten-veneris*), amor-de-hortelão (*Galium aparine*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*) e outras vivazes.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água, e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calcule previamente o débito do material de aplicação. Não utilizar atomizadores na aplicação do produto. Após a aplicação do herbicida, lavar o material com água e detergente. Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



P002173881411



Edição CLP 1