

Garlon[®]

Herbicida Sistémico

**Nº 1
A ELIMINAR
SILVAS**

**Excelente eficácia em
acácias e outras
arbustivas**



Garlon®

Elevada eficácia contra silvas, acácias, labaças...

Para o controlo das infestantes para terrenos não cultivados, silvados perto de vinhas e pomares, e pastagens de gramíneas.

O **GARLON** é um herbicida sistémico, absorvido pelas folhas, caules e raízes que é rapidamente translocado pela planta.

O **GARLON** assegura uma destruição eficaz e duradoura da parte aérea e radicular das espécies, uma vez que tem a capacidade de, na planta, migrar rapidamente do sistema aéreo para o radicular.

PRINCIPAIS INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS



Labaças (*Rumex* spp.), Botão-de-ouro (*Ranunculus repens*). Cardo (*Cirsium* spp.), Urtiga (*Urtica dioica*), Língua-de-vaca (*Anchusa azurea*).

E as **espécies lenhosas**: Silvas (*Rubus fruticosus*), Roseira-brava (*Rosa canina*), Urze (*Calluna vulgaris*). Tojo (*Ulex* spp.) Acácias (*Acacia* spp.)

DOSES E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO

Cultura	Dose l/ha	Época de aplicação
Terrenos não cultivados	3 l/ha	Aplicar quando as infestantes se encontram em vegetação activa, no fim da Primavera, princípio de Verão, de preferência com tempo calmo e húmido mas não chuvoso. Em acácias muito desenvolvidas pode proceder-se ao corte e pulverizar quando a rebentação tenha uma área foliar suficiente para absorver o produto.
Silvados perto de vinhas e pomares	3 l/ha	Aplicar no Inverno, quando as cepas e árvores se encontram em repouso vegetativo, e as silvas continuam com as folhas verdes.
Pastagens de gramíneas	2 a 3 l/ha	Aplicar no início da Primavera quando as infestantes se encontram em desenvolvimento. Aplicação contra as labaças deve ser realizada antes da saída do escape floral.

VANTAGENS

- Herbicida sistémico
- Excelente eficácia em silvas, acácias e outras arbustivas
- Selectivo para gramíneas
- Baixa toxicidade para homem mamíferos, aves e abelhas
- Não é residual e não se acumula no solo

