

ECONATUR **ZINTRAC-S**

DESCRIÇÃO:

ZINTRAC-S é um bioestimulante e bioprotector indicado para a activação do metabolismo secundário das plantas, através da indução de fitoalexinas e metabolitos antioxidantes protectores da planta, reforçando o sistema imunitário perante condições climáticas adversas do tipo biótico no solo.

PROCESSO DE OBTENÇÃO / PROPRIEDADES:

ZINTRAC-S é obtido e composto por matérias-primas, conforme o Regulamento CE 834/2007, R. CE 889/2008, USDA-NOP (National Organic Program EEUU), os quais estão incluídos segundo o Anexo I do R. CE 889/2008, nas definições de "Oligoelementos" (micronutrientes inorgânicos enumerados na parte E do anexo I do RCE nº 2003/2003). Durante o processo de fabricação não ocorre nenhum tipo de síntese química. No processo de obtenção é garantida a ausência, na sua composição, de material modificado geneticamente (não OGM), resíduos de fitossanitários, amónios quaternários, fosfanatos, percloratos ou de microorganismos patogénicos.

COMPOSIÇÃO (P/P):

Zinco (Zn) solúvel em água: 3,0 %

FORMA DE APLICAÇÃO E DOSE

Aplicação via radicular e aspersão:

- 1) Preparação do solo para conseguir um solo solto e sem aglomerados.
- 2) Regar o tempo suficiente até atingir a máxima capacidade de campo. Se necessário, realizar uma rega inicial e outra no dia seguinte, para conseguir a máxima capacidade de campo.
- 3) Aplicação do produto à dose de 5,0 - 8,0 L/ha, cobrindo o máximo possível a superfície do solo.
- 4) Realizar uma rega posterior à aplicação de **ZINTRAC-S** para facilitar a penetração e difusão do produto no solo.

Aplicação por rega localizada:

- 1) Não aplicar até que a cultura esteja totalmente instalada.
- 2) Aplicar na rega localizada quando o bolbo radicular está bem hidratado, à dose recomendada de acordo com a cultura e o estado fenológico da mesma (2,5 - 5 L/ha.aplicação).
- 3) Prolongar a rega após aplicação para favorecer a difusão.
- 4) Realizar uma aplicação a cada 30 dias, durante os momentos do ciclo cultural que sejam necessários.

RECOMENDAÇÕES

Realizar uma pré-diluição em água, num mínimo de três vezes a quantidade do produto a aplicar. Manter em constante agitação o depósito de calda, para favorecer a completa dissolução do produto. Recomenda-se realizar a aplicação com temperaturas entre 10 e 25 °C. pH recomendado da calda de aplicação entre 5 - 8.

CULTURAS

Alho, cebola, hortícolas, pequenos frutos, vinha e fruteiras.

INCOMPATIBILIDADES:

Não é compatível com cobre nem enxofre.

Não misturar com produtos com pH fora do intervalo 4 - 10.

Em caso de dúvida, solicite informação adicional: info@econatur.net ou lusosem@lusosem.pt.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

Cor: Castanho

Densidade: 1,10 - 1,20 g/cc

pH: 6,0 - 7,0

EMBALAGENS

1 L, 5 L e 20 L

REGULAMENTO	RCE 2003/2003	RCE 834/2007	NOP
Conforme/certificado	•	•	