

ECONATUR **ACTICUPER**

DESCRIÇÃO:

ACTICUPER é um activador biodinâmico, indicado para reforçar a actividade vegetativa nos momentos críticos do ciclo cultural, causados por stresses climáticos. O seu conteúdo em cobre activo engrossa as paredes celulares da cultura, uma vez que este elemento favorece a formação de enzimas responsáveis pela sua lenhificação. Desta forma, cria uma barreira interna nas folhas que impede o desenvolvimento de diferentes problemas causados por situações de stress. Recomendado para aplicação foliar.

PROCESSO DE OBTENÇÃO / PROPRIEDADES:

ACTICUPER é obtido através de matérias-primas conforme o R. CE 834/2007, R. CE 889/2008, USDA-NOP (National Organic Program EEUU), nas quais estão incluídas, segundo o Anexo I do RCE 889/2008, nas definições de "oligoelementos" (micronutrientes inorgânicos enumerados na parte E do anexo I do RCE nº 2003/2003). Durante o seu fabrico, não é gerado nenhum tipo de síntese química. O processo de obtenção garante a ausência na sua composição de material modificado geneticamente (não OGM), resíduos de fitossanitários, amónio quaternário, fosfanato, perclorato ou de microorganismos patogénicos.

COMPOSIÇÃO (P/P):

Cobre (Cu) solúvel em água: 3,0 %



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

Cor: Verde escuro

Densidade: 1,10 - 1,15 g/cc

pH: < 2,0

EMBALAGENS

250-500 cc, 1 e 5 L.

CULTURAS E DOSES:

Recomenda-se em aplicação preventiva via foliar, nos momentos de maior probabilidade de ocorrência de problemas fúngicos, devido a condições climáticas adversas. Durante a aplicação, todas as partes verdes da planta devem ficar bem molhadas. O intervalo entre aplicações dependerá do efeito conseguido, sendo o normal a cada 7 - 15 dias, de acordo com a evolução da cultura. Está especialmente indicado para fruteiras, vinha, pepino, tomate, groselha, chicória e ornamentais.

Cultura	Hortícolas exterior	Hortícolas de interior	Olival	Morango	Vinha	Prunóideas	Pomóideas	Citrinos
Dose Foliar (cc/L)	3,0 - 6,0*	2,5 - 4,5 *	1,0 - 2,0	1,0 - 1,5*	2,5 - 4,0	0,5 - 1,0**	1,0 - 2,0**	1,0 - 2,0

IMPORTANTE

NÃO APLICAR EM ALFACE NEM EM BANANEIRA.

*Não repetir antes de 8 - 10 dias após a aplicação anterior, nem adicionar nenhum tipo de corrector de pH com este produto.

**Começar as aplicações sempre com a dose inferior, principalmente na presença de frutos. Doses altas e condições climáticas instáveis (altas-baixas temperaturas), podem provocar queimaduras ou fitotoxicidades pontuais. É importante cobrir correctamente toda a superfície foliar durante a aplicação, sem aplicar em excesso.

INCOMPATIBILIDADES:

Não aplicar nas horas de insolação máxima.

Não é recomendável utilizar nos momentos de condições climatéricas instáveis, como a possibilidade de geada ou altas temperaturas. Não exceder a dose recomendada. Recomenda-se realizar um teste prévio de mistura e compatibilidade com a cultura. Em caso de dúvida, solicite informação adicional: info@econatur.net ou lusosem@lusosem.pt.