

COMPOSIÇÃO

Bactérias:

Streptomyces beta-vulgaris souche B11 (I-3639): 1x10⁹ UFC/g
Burkholderia sp souche AGN02 (I-4360): 1x10⁹ UFC/g
Bacillus megaterium souche AGN01 (I-4466): 1x10⁹ UFC/g

Micorriza:

Rhizophagus irregularis souche DAOM 197198: 1%

ESPECIFICAÇÕES

Formulação

Utilização

Embalagem

Condições de armazenamento

Forma

Prazo de validade

Densidade

Solução bacteriana + micorrizas

Solo e Fertirrigação

5L

Manter o produto na embalagem original bem fechada em um local seguro, longe do alcance de crianças, animais e contato com alimentos. Proteger de temperaturas extremas (geada) e exposição solar. Armazenar entre 4°C -30°C graus. Não expor a temperaturas superiores a 35°C.

Líquido (SC)

12 meses

1.27

VANTAGENS

Funções do microrganismo	Características	Propriedades da formulação
<i>Bacilo megaterium:</i> / Solubilização do fósforo / Produção de fitormônios / Estimulação da germinação de sementes <i>Streptomyces beta-vulgaris:</i> / Produção de fitormônios / Estimulação do sistema radicular / Melhoria da atividade microbiológica no solo <i>Burkholderia sp.:</i> / Endófito de raiz / Solubilização do fósforo / Produção de fitormônios Fungos micorrízicos: / Estimula o desenvolvimento radicular	Use os recursos da natureza para alimentar as culturas e aumentar o suprimento natural de fósforo. inO-BACT P-MYC / Solubilização do fósforo inorgânico / Mineralização do fósforo inorgânico / Produção de fitormônios / Assimilação de nutrientes	Solução composta por bactérias e endomicorrizas De Sangosse desenvolve pesquisas há mais de 10 anos sobre o solo e suas capacidades naturais. Nós temos um banco de 50 cepas de bactérias identificadas devido às suas propriedades únicas. De Sangosse adquiriu experiência em isolar e multiplicar espécies com propriedades agronômicas de interesse. O seu laboratório especializado possui recursos humanos e competências tecnológicas notáveis.

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Modo de aplicação: por fertirrigação ou pelo Solo

Ajustar o volume de água à superfície tratada (120 - 150 L/ha) - 2 aplicações por ano

/ Grandes culturas: 0,5 L/ha - durante a preparação do solo na Semeadura.

/ Hortaliças: 0,5 L/ha - durante a preparação do solo na sementeira ou em restos culturais. Em sistema de fertirrigação aplicar durante a implantação ou transplante.

/ Árvores frutíferas e uvas: 0,5L/ha – Durante o plantio, desde o aparecimento das primeiras folhas até a floração.

/ Espaços verdes: 0,5L/ha - durante a preparação do solo ou em recipientes de cultivo durante desenvolvimento.

Não aplicar em culturas onde as peças consumíveis possam entrar em contacto com o solo.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Respeitar um intervalo de 4 a 7 dias antes ou depois da pulverização de herbicidas.

inO-BACT P-MYC pode ser incorporado em fertilizantes sólidos EC ou NFU em doses de 0,3% a 20%.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Instruções de uso

/ Agite antes de usar.

/ Para melhor eficiência, use o produto sozinho em um sistema de aplicação limpo (spray).

/ Ajustar o volume de água à superfície tratada.

/ Não aplicar o produto 4 a 7 dias antes ou após a pulverização do herbicida.

Compatibilidade:

Pode ser misturado com a maioria dos fertilizantes e fungicidas, somente após diluição na mistura final.

Antes de misturar com outros produtos, faça sempre um teste de compatibilidade. Adicione inO-BACT N por último.

Não use cloro ou alvejantes que possam destruir bactérias e tornar o produto ineficaz.

Evite misturas com herbicidas. Limpe o pulverizador antes de usar para evitar qualquer resto de ingrediente ativo.