

COMPOSIÇÃO

Azoto (N): 90 g/L
Cálcio (CaO): 445 g/L
Manganês (Mn): 9 g/L
Zinco (Zn): 26 g/L
Silício (SiO₂): 57 g/L

Com extractos de algas marinhas

ESPECIFICAÇÕES

Formulação
Utilização
Embalagem
Condições de armazenamento

Forma
Prazo de validade

Termorregulador
Foliar
10 L
Conservar ao abrigo da geada e manter na embalagem original, ao abrigo da luz solar direta e bem fechado.
Líquida
24 meses

VANTAGENS

Funções dos elementos	Características	Propriedades da formulação
/ Melhoria significativa da atividade fotossintética. A sua aplicação por pulverização foliar permite melhorar a atividade fotossintética (fixação de carbono e eficiência hídrica) através do efeito Co₂. / Proteção das funções de produção em caso de stress (secagem das folhas), temperaturas elevadas, gestão da água e stress hídrico devido à manutenção da atividade fotossintética (efeito biomassa e rendimento).	inO-FLOW REGUL é um ativador único e inovador. Utilizado em aplicação foliar, o inO-FLOW REGUL destina-se a TORNAR A FOTOSSÍNTESE MAIS EFICAZ mesmo sob stress. Propriedades: / Aumenta a fixação do carbono e, por conseguinte, a percentagem de matéria seca, favorecendo assim o rendimento e a conservação. / Promove a uniformidade dos tamanhos e evita perdas de calibragem durante as fases de stress. / Melhora a transferência de água e de cálcio. / Melhora a produtividade e a qualidade e protege contra todos os tipos de stress (água, vento, frio ou temperatura elevada, stress, geada, granizo ...)	Granulometria ultra-fina: micronização 100% das partículas são inferiores a 10 microns. Eficácia de assimilação: a superfície micronizada das partículas permitem penetrar mais facilmente e mais rapidamente a cutícula da folha

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

APLICAÇÃO FOLIAR: Concentração máxima: 3

- ÁRVORES DE FRUTA: 2-3L/ha - 2-3 aplicações após a frutificação e depois a cada 15 dias
- UVAS: 2-3L/ha - 2-3 aplicações de 15 em 15 dias após a floração
- HORTICULTURA: Batatas: 2-3 L/ha - 2 aplicações a partir do início da fase de tubérculo e repetir 15 dias depois
Tomate: 2-3 L/ha - Após a frutificação
Bagas vermelhas: 2L/ha - 2-3 aplicações a partir do início da floração e depois de 15 em 15 dias
- CULTURAS ARVENSES - CEREAIS e CULTURAS FORRAGEIRAS: 2L/ha - 1 aplicação logo que a folhagem esteja suficientemente desenvolvida
- MILHO (COM OU SEM IRRIGAÇÃO): 2L/ha - 1 aplicação a partir do estágio de 8-10 folhas até ao limite do trator.
- CULTURAS DE PRIMAVERA (SOJA, GIRASSOL, ERVILHA...): 2L/ha - 1 aplicação a partir do estágio de 10 folhas.

CONSELHOS PRÁTICOS

Instruções de utilização:

Para obter melhores resultados, use água suficiente para obter uma cobertura uniforme da cultura até ao ponto de escoamento. Evite pulverizar sob luz solar muito forte e / ou temperaturas muito altas. Se possível, aplique durante a noite ou no início da manhã, especialmente se as temperaturas diurnas excederem 25° C. Consultar a tabela de recomendações de culturas para taxas de aplicação e horários para culturas individuais. Utilizar apenas ao ar livre.

A folhagem muito jovem e as culturas sob stress podem ser mais susceptíveis ao escaldão. Nestas circunstâncias, devem ser aplicadas doses mais baixas e o intervalo de aplicação deve ser reduzido em conformidade.

Mistura: Encher o tanque de pulverização com metade da quantidade necessária de água e iniciar a agitação. Agitar bem o recipiente e adicionar a quantidade necessária do nosso produto, depois adicionar o resto da água mantendo a agitação contínua. Após a pulverização, limpar e enxaguar bem o equipamento de pulverização.

Compatibilidade: Ler sempre os rótulos dos produtos e seguir sempre as instruções do fabricante para todos os produtos. Algumas configurações, fora do controlo do fabricante ou do distribuidor, podem ter repercussões no desempenho dos produtos co-aplicados. Por conseguinte, a co-aplicação é feita por conta e risco do utilizador final. Ao combinar com outros componentes numa mistura de tanque, adicionar sempre este produto em último lugar. Em caso de dúvida, consultar o fabricante ou o distribuidor em causa.

IMPORTANTE: respeitar as utilizações, as doses, as condições e as instruções de utilização indicadas na embalagem, que são determinadas em função das características do produto e das aplicações para as quais é recomendado. Nesta base, conduzir a cultura e os tratamentos de acordo com as melhores práticas agrícolas tendo em conta, sob a sua responsabilidade, todos os factores específicos da sua exploração, tais como as características do solo, as condições climáticas, os métodos de cultivo, as cultivares e as suas resistências específicas. O fabricante garante a qualidade dos seus produtos apenas na sua embalagem inicial durante o período indicado nos certificados do fabricante. Garantem a sua conformidade com a composição indicada na embalagem e com a regulamentação atualmente em vigor. As brochuras sobre as medidas de precaução estão disponíveis a pedido.