

COMPOSIÇÃO

Azoto (N): 300 g/L
Magnésio (MgO): 33 g/L
Enxofre (SO₃): 67 g/L

ESPECIFICAÇÕES

Formulação

Utilização

Embalagem

Condições de armazenamento

Forma

Prazo de validade

Libertação lenta de azoto

Foliar

10 L

Armazenar ao abrigo da geada e manter na embalagem original da luz solar direta e bem fechado

Líquido

24 meses

VANTAGENS

Funções dos elementos	Características	Propriedades da formulação
Azoto: - Componente essencial das proteínas - Papel enzimático - Fotossíntese Enxofre: - Componentes das proteínas - Papel enzimático - Fotossíntese Magnésio: - Fotossíntese - Síntese de hidratos de carbono e lípidos	inO-GREEN N é uma formulação líquida pronta a usar que contém azoto, magnésio e enxofre de libertação lenta. inO-GREEN N é uma formulação original com um novo composto de azoto. As vantagens da utilização de inO-GREEN N são uma libertação mais lenta de azoto para um risco reduzido de queimaduras. inO-GREEN N combina o azoto com um equilíbrio mineral específico. Melhora a homogeneidade e a qualidade da colheita.	Solução fertilizante de azoto, com um novo composto nitrogénico. O azoto de libertação lenta forma uma forte ligação química que liberta o azoto lentamente para uma menor queima, melhor absorção e translocação: - 33% de azoto de libertação lenta - 67% de forma de ureia Esta formulação com azoto de libertação lenta permanece na superfície do tecido vegetal em fase líquida durante muito mais tempo do que os produtos à base de ureia convencionais.

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

APLICAÇÃO FOLIAR:

CEREAIS - 5- 20 L/ha em 100L min de água - Desde a abertura da bainha da folha até à floração (emergência da espiga).

ARROZ - 5- 20 L/ha em 100L min de água - Momento: 1-2 aplicações aos 15 - 45 - 55 dias após a sementeira em arroz intensivo

MILHO - Taxa: 5- 20 L/ha em 200L min. de água - Calendário: A partir de 4-6 folhas e 10-15 dias depois, se necessário

BATATA - 5- 20 L/ha 200L Antes da iniciação dos tubérculos e no início da fase de floração.

BETERRABA - 5- 20 L/ha 100L min de água - A 4-6 folhas e um mês depois, se necessário.

GIRASSOL - 5- 20 L/ha 100L min de água - A partir de 5-6 pares de folhas até ao aparecimento da inflorescência

BETERRABA - 5- 10 L/ha 100L min de água - A partir de 4-6 folhas e 1 mês depois se necessário

BRÁSSICAS - 5 - 20 L/ha 100L min de água - A partir de 4-8 folhas, depois no início do alongamento do caule (C1) e no final da fase de emergência da inflorescência (D2).

VINHA - Volume de água mínimo 200 L/ha - 5-10L/ha. Suporte nutricional - 2 aplicações desde a fase de desdobramento das folhas até à separação dos gomos das flores (antes da floração) - 20 L/ha. Melhoria do teor de azoto do mosto - 2 aplicações por volta do amolecimento dos bagos, com um intervalo de 15 dias - 5- 20 L/ha. Pós-colheita: 1 aplicação após a colheita e antes do início da queda das folhas

ÁRVORES DE FRUTO, CITRINOS - Volume de água mínimo 500 L - 5-10 L/ha. Suporte nutricional - 1 aplicação antes da floração (frutos de pevide e citrinos) e/ou 1 aplicação a partir da queda das pétalas - 5-10 L/ha. Pós-colheita: 1 aplicação após a colheita e antes do início da queda das folhas.

MANGA - 5-10 L/ha 500L min de água - 1-2 aplicações desde o vingamento dos frutos até ao seu alargamento.

CONSELHOS PRÁTICOS

Instruções de utilização:

Para obter melhores resultados, utilizar água suficiente para obter uma cobertura uniforme da cultura até ao ponto de escorrimento. Evitar pulverizar sob luz solar muito forte e/ou temperaturas muito elevadas. Se possível, aplicar durante a noite ou de manhã cedo, especialmente se as temperaturas diurnas excederem os 25°C. Consulte a tabela de recomendações de culturas para taxas de aplicação e horários para culturas individuais. Utilizar apenas ao ar livre.

A folhagem muito jovem e as culturas sob stress podem ser mais susceptíveis ao escaldão. Nestas circunstâncias, devem ser aplicadas doses mais baixas e o intervalo de aplicação deve ser reduzido em conformidade.

- Mistura: Encher o tanque de pulverização com metade da quantidade necessária de água e iniciar a agitação. Agitar bem o recipiente e adicionar a quantidade necessária do nosso produto, depois adicionar o resto da água mantendo a agitação contínua. Após a pulverização, limpar e enxaguar bem o equipamento de pulverização

Compatibilidade: Ler sempre os rótulos dos produtos e seguir sempre as instruções do fabricante para todos os produtos. Algumas configurações, fora do controlo do fabricante ou do distribuidor, podem ter repercussões no desempenho dos produtos co-aplicados. Por conseguinte, a co-aplicação efectuada é feita por conta e risco do utilizador final. Ao combinar com outros componentes numa mistura de tanque, adicionar sempre este produto em último lugar. Em caso de dúvida, consultar o fabricante ou o distribuidor em causa.

IMPORTANTE: respeitar as utilizações, as doses, as condições e as instruções de utilização indicadas na embalagem, que são determinadas em função das características do produto e as aplicações para as quais é recomendado. Nesta base, efetuar as culturas e os tratamentos de acordo com as melhores práticas agrícolas, tendo em conta, sob a sua responsabilidade, todos os factores específicos da sua exploração, tais como as características do solo, as condições climáticas, os métodos de cultivo, as cultivares e as suas resistências específicas. O fabricante garante a qualidade dos seus produtos apenas na sua embalagem inicial durante o período indicado nos nossos certificados do fabricante. Garantem a sua conformidade com a composição indicada na embalagem e à regulamentação atualmente em vigor. As brochuras com medidas de precaução estão disponíveis mediante pedido.