



COMPOSIÇÃO

Azoto (N): 104 g/L
Fósforo (P2O5): 36 g/L
Potássio (K2O): 85 g/L
Magnésio (MgO): 1,3* g/L
Enxofre (SO3): 1 g/L
Boro (B): 0,5 g/L
Cobre (Cu): 0,14* g/L
Ferro (Fe): 0,25* g/L
Manganês (Mn): 0,5* g/L
Molibdénio (Mo): 0,05 g/L
* quelatado por EDTA
Com uma seleção de aminoácidos 2%

ESPECIFICAÇÕES

Formulação

Utilização

Embalagem

Condições de armazenamento

Forma

Prazo de validade

Ativos Nutricionais Celulares & L-Amino-Ácidos de origem vegetal

Foliar

10 L

Armazenar ao abrigo da geada e manter na embalagem original da luz solar direta e bem fechado

Líquido

24 meses

VANTAGENS

Funções dos elementos

A nossa tecnologia "Active Nutritional Cellular & Seleção de Amino-Ácidos

"1 Active Nutritional Cellular: complexo único de nutrientes direccionados

/ Respeita o equilíbrio mineral natural da seiva e reequilibra a nutrição da planta

/ Cria uma sobreconcentração temporária de nutrientes minerais que ajuda a planta a reequilibrar-se

/ Aumento da absorção radicular.

2- Seleção dos aminoácidos

É muito importante ter uma mistura bem equilibrada de Aminoácidos na planta, de forma a obter o mais amplo espectro de atividade celular. Os aminoácidos desempenham um papel crítico em muitos processos fisiológicos.

Características

inO GREEN Ultra NG melhora o estado nutricional da cultura. Utilizado em pulverização foliar, ativa o metabolismo de cada célula vegetal. Esta ação sobre a planta inteira melhora a fotossíntese e a capacidade de absorção dos elementos minerais pelo sistema radicular.

inO-GREEN Ultra NG é um produto polivalente que é adequado a numerosas culturas.

inO-GREEN Ultra NG melhora: Metabolismo do azoto / Reforço / Energia / Fotossíntese / Desenvolvimento vegetativo / Fim de ciclo final do ciclo / Maturação / Regulação do stress osmótico e hídrico / Regulação do stress hídrico / Germinação da semente / Crescimento da raiz / Floração / Qualidade do rendimento Floração / Qualidade do rendimento

Propriedades da formulação

>Active Nutritional Cellular:

1- Efeito sobre a estimulação foliar

2- Efeito nutritivo através das folhas

3- Efeito adjuvante: melhoria da qualidade de pulverização

- Os aminoácidos têm um efeito naturalmente complexante: o efeito complexante é o resultado da união de 2 aminoácidos ácidos com um átomo de metal (Fe, Cu, Mn, Zn).

Os aminoácidos aumentam a absorção dos iões metálicos favorecendo a permeabilidade da membrana celular.

O nível de absorção pelas folhas é efetivamente melhorado.

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

APLICAÇÃO FOLIAR: 5 L/ha em 100 L/ha min de água - CEREALIS - Desde o alongamento do caule até à fase de arranque da última folha emergente até ao início da espiga - LEGUMES, ERVILHAS - 5-10 cm - início da floração - vagens planas - BATATAS - 3-4 aplicações desde o início da formação dos tubérculos e depois de 14 em 14 dias - MILHO, OLEAGINOSAS, BAGAÇO DE AÇÚCAR - 1-2 aplicações - em caso de stress após a emergência, depois conforme necessário na folhagem bem desenvolvida - HORTÍCOLAS - 3-4 aplicações, a cada 10 - 14 dias a partir do estabelecimento - VINHA - 2-3 aplicações em cachos separados, no início da floração e antes do fecho dos cachos, depois a cada 10-14 dias, conforme necessário - FRUTÍCOLAS - 4 aplicações a partir da queda das pétalas e depois a cada 14 dias - CITRINOS - 4 aplicações a partir da queda das pétalas e depois de 14 em 14 dias - KIWI - 4 aplicações a partir da queda das pétalas e depois de 14 em 14 dias - BAGAS - 1-2 aplicações em folhagem bem desenvolvida - BANANEIRAS - 3-5 aplicações, a cada 2 - 3 semanas a partir do início vegetativo - ANANÁS - Ananás fresco: 5° - 6° mês - Ananás de conserva: 8° - 9° mês

CONSELHOS PRÁTICOS

Instruções de utilização:

Para obter melhores resultados, utilizar água suficiente para obter uma cobertura uniforme da cultura até ao ponto de escorrimento. Evitar pulverizar sob luz solar muito forte e/ou temperaturas muito elevadas. Se possível, aplicar durante a noite ou de manhã cedo, especialmente se as temperaturas diurnas excederem os 25°C. Consulte a tabela de recomendações de culturas para taxas de aplicação e horários para culturas individuais. Utilizar apenas ao ar livre.

A folhagem muito jovem e as culturas sob stress podem ser mais susceptíveis ao escaldão. Nestas circunstâncias, devem ser aplicadas doses mais baixas e o intervalo de aplicação deve ser reduzido em conformidade.

- Mistura: Encher o tanque de pulverização com metade da quantidade necessária de água e iniciar a agitação. Agitar bem o recipiente e adicionar a quantidade necessária do nosso produto, depois adicionar o resto da água mantendo a agitação contínua. Após a pulverização, limpar e enxaguar bem o equipamento de pulverização

Compatibilidade: Ler sempre os rótulos dos produtos e seguir sempre as instruções do fabricante para todos os produtos. Algumas configurações, fora do controlo do fabricante ou do distribuidor, podem ter repercussões no desempenho dos produtos co-aplicados. Por conseguinte, a co-aplicação efectuada é feita por conta e risco do utilizador final. Ao combinar com outros componentes numa mistura de tanque, adicionar sempre este produto em último lugar. Em caso de dúvida, consultar o fabricante ou o distribuidor em causa.

IMPORTANTE: respeitar as utilizações, as doses, as condições e as instruções de utilização indicadas na embalagem, que são determinadas em função das características do produto e as aplicações para as quais é recomendado. Nesta base, efetuar as culturas e os tratamentos de acordo com as melhores práticas agrícolas, tendo em conta, sob a sua responsabilidade, todos os factores específicos da sua exploração, tais como as características do solo, as condições climáticas, os métodos de cultivo, as culturas e as suas resistências específicas. O fabricante garante a qualidade dos seus produtos apenas na sua embalagem inicial durante o período indicado nos nossos certificados do fabricante. Garantem a sua conformidade com a composição indicada na embalagem e à regulamentação atualmente em vigor. As brochuras com medidas de precaução estão disponíveis mediante pedido.



Lusosem
produtos para agricultura, S.A.

Distribuidor: LUSOSEM - R. General Ferreira Martins, n- 10 - 9-A 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242 - lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

Fabricado por: DE SANGOSSE «Bonnell» - BP5 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE - Tél: 05.53.69.36.30