

COMPOSIÇÃO

Azoto (N): 60 g/L
Boro (B): 120 g/L
Manganês (Mn): 1,2 g/L
Molibdénio (Mo): 6 g/L

ESPECIFICAÇÕES

Formulação

Utilização

Embalagem

Condições de armazenamento

Forma

Prazo de validade

Lignosulfonatos

Foliar

10 L

Armazenar ao abrigo da geada e manter na embalagem original da luz solar direta e bem fechado

Líquido

24 meses

VANTAGENS

Funções dos elementos	Características	Propriedades da formulação
Boro: - Papel na floração e na frutificação - Migração de açúcares - Síntese de proteínas - Atividade meristemática e crescimento - Utilização de auxinas na planta Molibdénio: - Redução de nitratos - Síntese proteica - Contribui para a nodulação das leguminosas	inO-MIX BMO é um produto versátil. É constituído por uma fórmula totalmente equilibrada e especificamente adaptada às necessidades das culturas de brássicas. inO-MIX BMO é composto por elementos nutritivos de grande pureza e totalmente solúveis.	Lignosulfonatos Base: Compostos orgânicos extraídos da madeira (lignina). - Propriedades "quelantes" naturais = capacidade de formar complexos estáveis e solúveis com iões metálicos (Ferro-Cu-Mn-Zn) - Propriedades adjuvantes naturais - Molhabilidade (espalhamento) - Adesividade (resistência à lavagem) - Efeito humidificante (evita a cristalização) Nível de absorção próximo de 80 - 90 %

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

APLICAÇÃO FOLIAR:

GIRASSOL: 3L/ha em 200L/ha min de água - 2 aplicações a partir de 5 pares de folhas até à pré-floração

BETERRABA: 3L/ha em 200L/ha min de água - 2 aplicações durante o período de arranque e em culturas bem estabelecidas

BRÁSSICAS ar livre, SEMENTES DE ÓLEO, TREVO: 3L/ha em 200L/ha min de água - 1-2 aplicações a partir de 2-3 folhas até ao início da floração

ERVILHAS: 3L/ha em 600L/ha min de água - 1-2 aplicações a partir de 5-6 folhas até à pré-floração.

HORTÍCOLAS, FRUTÍCOLAS E KIWI: 3L/ha em 500L/ha min de água - 1 a 2 aplicações em culturas bem estabelecidas ou antes e depois da floração VINHA: 2L/ha em 500L/ha min de água - Quando a inflorescência for visível, quando a inflorescência estiver totalmente desenvolvida e no final da floração. 10 L/ha em 700 L/ha min de água na madeira de inverno

CONSELHOS PRÁTICOS

Instruções de utilização:

Para obter melhores resultados, utilizar água suficiente para obter uma cobertura uniforme da cultura até ao ponto de escorrimento. Evitar pulverizar sob luz solar muito forte e/ou temperaturas muito elevadas. Se possível, aplicar durante a noite ou de manhã cedo, especialmente se as temperaturas diurnas excederem os 25°C. Consulte a tabela de recomendações de culturas para taxas de aplicação e horários para culturas individuais. Utilizar apenas ao ar livre.

A folhagem muito jovem e as culturas sob stress podem ser mais susceptíveis ao escaldão. Nestas circunstâncias, devem ser aplicadas doses mais baixas e o intervalo de aplicação deve ser reduzido em conformidade.

- Mistura: Encher o tanque de pulverização com metade da quantidade necessária de água e iniciar a agitação. Agitar bem o recipiente e adicionar a quantidade necessária do nosso produto, depois adicionar o resto da água mantendo a agitação contínua. Após a pulverização, limpar e enxaguar bem o equipamento de pulverização

Compatibilidade: Ler sempre os rótulos dos produtos e seguir sempre as instruções do fabricante para todos os produtos. Algumas configurações, fora do controlo do fabricante ou do distribuidor, podem ter repercussões no desempenho dos produtos co-aplicados. Por conseguinte, a co-aplicação efectuada é feita por conta e risco do utilizador final. Ao combinar com outros componentes numa mistura de tanque, adicionar sempre este produto em último lugar. Em caso de dúvida, consultar o fabricante ou o distribuidor em causa.

IMPORTANTE: respeitar as utilizações, as doses, as condições e as instruções de utilização indicadas na embalagem, que são determinadas em função das características do produto e as aplicações para as quais é recomendado. Nesta base, efetuar as culturas e os tratamentos de acordo com as melhores práticas agrícolas, tendo em conta, sob a sua responsabilidade, todos os factores específicos da sua exploração, tais como as características do solo, as condições climáticas, os métodos de cultivo, as cultivares e as suas resistências específicas. O fabricante garante a qualidade dos seus produtos apenas na sua embalagem inicial durante o período indicado nos nossos certificados do fabricante.

Garantem a sua conformidade com a composição indicada na embalagem e à regulamentação atualmente em vigor. As brochuras com medidas de precaução estão disponíveis mediante pedido.