

Blindar™

Mais vale prevenir que arrancar



Blindar™

Mais vale prevenir que arrancar



Fungicida para
o controlo da Esca
e de Doenças
do Lenho.

Trichoderma asperellum
+
Trichoderma gamsii

Formulação otimizada de elevada qualidade

Fácil aplicação; Rápida instalação

Máxima protecção contra feridas

**Resistente a tratamentos químicos e a
condições climáticas adversas**

**Autorizado em modo de produção
biológico**

**Não necessita de condições especiais
de armazenamento.**

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Autorização de venda nº 00874 concedida pela DGAV

Blindar™

Mais vale prevenir que arrancar

Autorizado em
modo produção
Biológico

Fungicida

Lusosem®

As doenças do lenho da videira são causadas por um grande complexo de fungos. Essas doenças produzem a decadência da planta, o que acarreta grandes perdas na quantidade e qualidade da colheita.

Blindar é um fungicida autorizado em modo de produção biológico com acção preventiva à base de 2 estirpes de Trichoderma: *Trichoderma Gamsii* e *Trichoderma Asperellum*.


A existência das duas estirpes facilitam a instalação nas feridas, criando uma barreira física e biológica que impede a infecção da planta por patógenos.

Porquê duas estirpes?

› **Maior eficácia.** Sistema de interação com o patógeno mais relevante.


› **Maior resistência** em diferentes condições ambientais.

Trichoderma asperellum + *Trichoderma gamsii*



Ensaio de eficácia na Vinha

EVOLUÇÃO ACUMULADA PLANTAS AFETADAS (%) 2017 vs 2019



Localização: Villarrobledo (Albacete)
Cultura: Vinha vinícola
Variedade: Cabernet-Sauvignon

Densidade plantação: 2.666 pl./Ha.
Ano de plantação: 1996


Blindar™

Máxima protecção face a novas infecções



Ensaio de eficácia na Vinha

AUMENTO DE PLANTAS AFETADAS (%)



Localização: Tirgo (La Rioja)
Cultura: Vinha vinícola
Variedade: Tempranillo

Densidade de plantação: 3200 plantas/Ha
Ano de plantação: 1999

Blindar™

Protecção da vinha desde a primeira aplicação



Como aplicar Bindar?

Realizar sempre a Pré-germinação de esporos

Pré-germinação de esporos

› 24 horas antes da aplicação

› 1 kg de Blindar® / 10 Litros de água*

*a uma temperatura >10°C



Doses e modos de aplicação

› Aplicar 1 Kg/ha

› Realizar uma aplicação depois da poda

› Rápida instalação
Menos de 6 horas com temperatura > 10°C

