


COPFORCE® EXTRA

FUNGICIDA



**INDICADO
PARA COMBATER O MÍLDIO
DA VIDEIRA, BATATEIRA E TOMATEIRO
E ALTERNARIOSE DO TOMATEIRO**

COPFORCE® EXTRA

FUNGICIDA

O **COPFORCE® EXTRA** é um fungicida à base de cimoxanil e cobre apresentando complementaridade entre dois modos de acção.

Tem actividade preventiva e curativa.

O **Cimoxanil** pertence ao grupo químico das cianoacetamidas oximas, é um fungicida penetrante que penetra no interior dos tecidos vegetais, inibindo a formação das paredes celulares dos fungos, por mecanismo(s) de acção desconhecido(s), possui actividade curativa quando aplicado imediatamente após a infecção.

O **cobre** pertence ao grupo químico dos inorgânicos, é um fungicida de superfície, que inibe vários processos metabólicos, actuando em diversas enzimas, com actividade preventiva.



UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Cultura	Doença	Dose	Época e condições de aplicações	I.S.
Batateira	Míldio (<i>Phytophthora infestans</i>);	2 Kg/ha (Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano)	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, iniciar os tratamentos após a primeira contaminação e manter a cultura protegida enquanto as condições sejam favoráveis à doença (BBCH 21 a 90). Os tratamentos devem ser realizados com intervalos de 8-10 dias. Efetuar no máximo 5 aplicações (Não aplique mais de uma vez na produção de batata precoce). Volume de calda a utilizar: 300 a 1000 L/ha.	14 dias
Videira	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	2 Kg/ha (Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano)	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, iniciar os tratamentos logo após o aparecimento dos primeiros focos de míldio na região. Utilizar este produto em tratamentos pós floração (BBCH 55 a 80). Os tratamentos devem ser realizados com intervalos de 8-10 dias. Efetuar no máximo 4 aplicações. A persistência de ação é de 12 dias, reduzida para 8 dias, em condições de maior pressão da doença e no período de maiores crescimentos da planta. Volume de calda a utilizar: 500 a 1000 L/ha.	28 dias
Tomateiro	Míldio (<i>Phytophthora infestans</i>) e Alternariose (<i>Alternaria solani</i>);	2 Kg/ha (Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano)	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos em condições favoráveis à doença, do início da emergência da inflorescência até ao início da maturação do fruto (BBCH 51 a 71). Efetuar no máximo 4 aplicação. A persistência de ação é de 8 - 10 dias. Volume de calda a utilizar: 300 a 1000 L/ha.	3 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, dever-se-á proceder, sempre que possível, à alternância dos tratamentos deste fungicida com outros possuindo diferente modo de acção e pertencentes a outros grupos químicos.

COPFORCE EXTRA

Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 60 g/Kg ou 6% (p/p) de cimoxanil e 300 g/Kg ou 30% (p/p) de cobre (461 g/Kg ou 46.1% (p/p) na forma de hidróxido de cobre)

Autorização de venda n.º **1883/1** concedida pela DGAV

Antes de usar o produto fitofarmacêutico leia o rótulo

Titular da autorização de venda:



Distribuído por :

 **Lusosem**
www.lusosem.pt