

Gatten®

Fungicida

Anti-óidio com novo modo de acção.

VANTAGENS

-  Acção específica contra o óidio em baixa dose
-  Actividade, preventiva, curativa e translaminar
-  Diferente modo de Acção - FRAC U13, sem resistências cruzadas
-  Excelente ferramenta em programas de controlo
-  Boa persistência e resistência à lavagem



AV nº1909 concedida pela DGAV

Concentrado para emulsão
contendo 50 g/L (5% p/v) de Flutianil.

 OAT Agrio Co., Ltd.

Antes de utilizar os produtos fitofarmacêuticos, leia sempre o rótulo.

 Lusosem®



Gatten®

Fungicida

Anti-óidio com novo modo de acção.
Actividade, preventiva, curativa e translaminar.

 OAT Agrio

 Lusosem®


GATTEN é um novo fungicida descoberto pela OAT Agrio Co, com acção específica contra o oídio em baixa dose, em várias culturas. Apresenta actividade **preventiva, curativa e translaminar**. A sua actividade residual e resistência à lavagem contribuem para a sua longa persistência.

Com modo de acção inovador não apresenta resistências cruzadas com os fungicidas existentes.


MODO DE ACÇÃO

• LOCALIZAÇÃO EFECTIVA DA ACÇÃO DO FLUTIANIL NO CICLO DE VIDA DO OÍDIO.


O Flutianil inibe a formação do haustório, a extensão secundária das hifas e provoca a alteração morfológica dos conidióforos e por consequência a viabilidade dos esporos.



• Provoca alteração morfológica dos conidióforos - Conidióforos anormais



• Inibição da extensão secundária das hifas - prevenindo infecções secundárias



• ACTIVIDADE PREVENTIVA E CURATIVA


O GATTEN tem uma actividade preventiva e curativa que inibe o desenvolvimento de sintomas, a esporulação e a viabilidade dos esporos.

Resultados de eficácia do Gatten em folhas e Cachos.



• ACTIVIDADE RESIDUAL E RESISTÊNCIA À LAVAGEM - PERSISTÊNCIA DE ACÇÃO

A forte actividade residual do Gatten aliada à resitência à lavagem contribuem para a sua elevada persistência de acção.



GESTÃO DE RESISTÊNCIAS

O Flutianil, ingrediente activo do GATTEN, pertence a uma nova classe química de fungicida do grupo ciano-metileno tiazolidina e um novo modo de acção - **FRAC grupo U13**. GATTEN é eficaz para o uso estratégico em programas que visam minimizar o desenvolvimento de resistências das doenças aos fungicidas habitualmente utilizados.

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

FASE DE DESENVOLVIMENTO DA VINHA



Gatten® 0,5 L/ha

Cultura / Doença	Dose:	Aplicações	I.S.
Videira Oídio, Erysiphe necator	0,5 L/ha	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes iniciar os tratamentos dos cachos visíveis até ao fecho dos cachos, enquanto se verificarem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. BBCH 19 - 87. Número máximo de aplicações: 2	12-14 dias