

Escolha a solução que melhor encaixe



Acerte em cheio nas infestantes



Tecnologia
Rinskor™ active

Loyant®
Agixa®
Novixid®

Programas Rinskor™ Active: a melhor estratégia para solucionar problemas complexos de infestantes no arroz.

Consiga os melhores resultados adaptando os programas de controlo às suas necessidades!

Os programas de controlo de Corteva Agriscience, com a nova tecnologia de Rinskor™ Active, oferecem soluções adaptadas aos problemas de cada parcela. A estratégia de aplicação baseada nesta tecnologia inovadora **melhora a rentabilidade da sua cultura de forma mais eficiente e sustentável.**

- Diferentes modos de ação que se reforçam e complementam.
- Melhor gestão das resistências.
- Maior eficácia e espectro de ação.
- A solução mais completa contra problemas complexos.

Novixid®

Rinskor™ active

HERBICIDA

A sua jogada vencedora contra as infestantes no arroz

A ajudar a cultivar o futuro das gerações vindouras

Graças à inovadora molécula Rinskor™ active e à eficácia comprovada da sua formulação, Novixid® resolve os seus problemas com infestantes de uma só vez, **melhorando a rentabilidade da sua cultura de forma mais eficiente e sustentável.**

Consiga melhores resultados com um só produto!

- Dois modos de ação que se reforçam e complementam.
- Melhor gestão das resistências.
- Maior eficácia e espectro de ação.
- Máxima comodidade: poupa tempo com uma só passagem.

O novo herbicida de pós-emergência de largo espectro que oferece um controlo muito bom das principais infestantes problemáticas na cultura do arroz


Novixid® o novo herbicida de pós-emergência de largo espectro que combina dois modos de ação que se reforçam e complementam, oferecendo um melhor resultado com um só produto. Novixid® oferece um controlo muito bom das principais infestantes na cultura do arroz, entre as quais se destacam a maioria das infestantes de folha larga, ciperáceas e *Echinochloa* spp*.

(*) ALS suscetível.

FOLHA LARGA		CIPERÁCEAS		GRAMÍNEAS	
Espécie	Novixid® (%) Eficácia (nº ensaios)*	Espécie	Novixid® (%) Eficácia (nº ensaios)*	Espécie	Novixid® (%) Eficácia (nº ensaios)*
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	99,9 (8)	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	84,8 (6)	<i>Echinochloa crus-galli</i>	93,0 (12)
<i>Ammannia coccinea</i>	98,4 (13)	<i>Butomus umbellatus</i>	79,5 (6)	<i>Echinochloa</i> spp.	91,2 (20)
<i>Bidens</i> spp.	100 (5)	<i>Cyperus difformis</i>	98,0 (18)		
<i>Heteranthera reniformis</i>	96,7 (13)	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (Plantas provenientes de semente)	84,4 (9)		
<i>Polygonum</i> spp.	92,6 (7)				

(*) Resultados ensaios de registo 2016-18.

Novixid® - Melhor controlo de *Echinochloa* spp



Nota: Comparações ortogonais: tratamentos incluídos nos mesmos ensaios.

Modo de aplicação

- Pós-emergência da cultura desde duas folhas até ao alongamento do caule (BBCH 12-32). Pós-emergência das infestantes.
- Tratamentos terrestres por pulverização normal com trator.
- Dose: 2,0 l/ha.
- Números de aplicações: 1 por campanha.
- Volume da calda: 150-400 l/ha.

Maior eficácia e espectro de ação




Tecnologia Rinskor™ active

Loyant®
Agixa®
Novixid®

Programas Corteva Agriscience

Dada a problemática atual no controlo de *Echinochloa* spp. nos arrozais de toda a Europa, é necessário a utilização de programas de tratamento para alcançar níveis de controlo satisfatórios desta infestante. Os programas da Corteva Agriscience nos quais se inclui duplo tratamento de Rinskor active oferecem melhores resultados do que a utilização de Novixid® num único tratamento contra *Echinochloa* spp., como foi demonstrado nos ensaios de registo.



Nota: Comparações ortogonais: tratamentos incluídos nos mesmos ensaios.

Seletividade

Produto seletivo em todas as variedades testadas tanto de tipo indica (grão longo) como das de tipo japónica (grão redondo).

Para garantir a máxima eficácia e seletividade é recomendado seguir corretamente as recomendações de uso do produto e as boas práticas de cultura, evitando sobreposições durante o tratamento.

Evitar aplicações em situação de forte stress.

Após o tratamento pode ocorrer uma resposta de caráter transitório da cultura que não afetará a produção final.

Recomendações de uso

- Seguir estritamente as instruções do rótulo do produto.
- Evitar tratamentos sob condições de stress.
- Calibrar corretamente os equipamentos de aplicação e evitar as sobreposições durante o tratamento.
- Momento ideal de aplicação quando as infestantes são pequenas e estão em crescimento ativo (atenção especial em sementeira a seco).
- Drenar o campo antes da aplicação garantindo que no mínimo 70% da superfície foliar das infestantes é exposta ao tratamento.
- Alagar o campo entre 1-3 dias depois da aplicação e mantê-lo alagado no mínimo 7 dias.



EA21F7B062H-DKJ011 / Amposta (T) / Sementeira: 29-Mar / Aplic.: 12-Jun/24-Jun / Foto: 24-Jul

Benefícios para o agricultor

