

10L



FLOW Regul

91010153

TERMO REGULADOR

Suporte à fotossíntese

FRUTEIRAS
HORTÍCOLAS
HORTO-INDUSTRIAIS

DE SANGOSSE



Na essência do crescimento



«Produto comercializado em Portugal por reconhecimento mútuo com a França:
1220512 de acordo com o Regulamento (EU) 2019/515”

FLOW Regul

Suspensão Concentrada de Cálcio, silício (solo diatomáceo) e elementos minerais.

APLICAÇÃO FOLIAR - Volume de diluição: 100 a 300 L

Culturas	Dose Máxima (L/Ha) Por aplicação	Aplicação Máxima por ano	Época de aplicação recomendada
Fruteira / Pequenos frutos	3	3	Todos os 10 a 15 dias Após floração
Vinha	2	4	Todos os 10 a 15 dias Durante todo o ciclo da cultura
Hortícolas	3	3	Todos os 10 a 15 dias Ao longo do ciclo da cultura ou durante o crescimento (hortícolas - folhas)
Ornamentais	3	3	Todos os 10 a 15 dias Durante todo o ciclo da cultura
Lawns, Meadows	3	3	Todos os 10 a 15 dias Durante todo o ciclo da cultura

ARMAZENAMENTO

Armazenar na embalagem original, fora da luz solar direta, bem fechada, em lugar seguro longe de crianças, animais e géneros alimentícios. Armazenar fora do frio. Quando armazenado corretamente, este produto deverá ter uma validade de 2 anos.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas de dados de segurança. Tripla lavagem. Não queime. Não utilize as embalagens para qualquer outra finalidade.

AVISO LEGAL :

O fabricante garante a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor. Nenhuma garantia é dada da utilização deste material e nenhuma responsabilidade aceite por algum dano ou prejuízo resultantes do armazenamento, manuseamento, aplicação ou utilização deste produto.

Contém oligoelementos: utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade.

- A utilização de equipamento adequado e bem conservado e a implementação de protecção colectiva constituem a primeira medida preventiva contra os riscos profissionais, antes da utilização da protecção individual.
- O uso de fato de trabalho ou EPI deve estar associado a cuidados de higiene (ex:lavagem de mãos, tomar duche no final do tratamento) e comportamento rigoroso (ex: procedimento de vestir/despir).
- Os procedimentos de limpeza e armazenamento de macacões e EPIs reutilizáveis devem obedecer às respectivas instruções de uso.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA :

Suplementares de rotulagem:
EUH208 Contém MISTURA REACIONAL (3:1) DE 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA E DE 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA. Pode provocar uma reacção alérgica.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais / internacionais de locais / regionais.

Fabricado por :

DE SANGOSSE

«Bonnels - BP5 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE

- Tél: 05.53.69.36.30



Distribuidor : LUSOSEM - R. General Ferreira Martins,
n° 10 - 9ªA 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242
- lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

Lusosem

Interesse Agronómico:

- Melhora a resistência ao stress abiótico: água, seca e tolerância ao calor (redução do fenómeno de escaldão) e mantém a qualidade das frutas e vegetais em Conservação/pós-colheita por uma contribuição em Cálcio e Silício.
- Aumenta a produtividade e a taxa de matéria seca melhorando a actividade fotossintética pelo fornecimento de silício e nutrientes.

Composição :

Matéria seca (DM): 72%
Azoto (N): 5.5% - Azoto ureico 5.5%
Óxido de Cálcio (CaO) solúvel em ácidos minerais: 27%
Dióxido de Silício ou Sílica (SiO₂): 3.4%
Manganês (Mn) total: 0.5%
Zinco (Zn): 1.5%
pH: 8.6%

Conselhos práticos de utilização

PREPARAÇÃO DA CALDA

Para melhores resultados, usar água suficiente para atingir uma cobertura uniforme até o ponto de escorrimento. Evite a pulverização com luz solar muito forte e / ou temperaturas muito altas. Se possível, aplicar durante a noite ou no início da manhã, especialmente se a temperatura durante o dia exceder 28 ° C. Folhagem muito jovem e culturas sob stress podem ser mais suscetíveis a queimaduras. Doses mais baixas devem ser aplicadas nestas circunstâncias e o intervalo entre aplicações adaptado. Consulte as Condições e Doses de Aplicação neste rótulo para obter as doses e condições de aplicação por cultura.

MISTURA

1. Encher o pulverizador com metade da quantidade de água pretendida e agitar.
2. Adicionar a quantidade necessária de INO BOOST e encher o pulverizador, mantendo a agitação. Quando aplicado com outros produtos, adicionar o INO BOOST sempre em último. Não permitir que a mistura se mantenha sem agitação.
3. Após pulverização, limpe e armazene o equipamento em segurança.

PRECAUÇÕES GERAIS

Armazenar num local seco e fresco. Em caso de incidente lavar imediatamente com água abundante.

PESO LÍQUIDO

16,5 kg



Na essência do crescimento