

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

- H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P391 Recolher o produto derramado.
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

- EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
S104c Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPe3 Em pomares de macieira e pereira, para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 m em relação às águas de superfície.
Spe3PT1 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
SPePT3 No caso de aplicações aéreas tomar em consideração os aspetos inerentes a esta técnica de aplicação, de modo a não contaminar as áreas circunvizinhas.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.
Telef: 800 250 250

Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

com 125 g/L ou 12,1% (p/p) de isoxabena

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica

O CENT-7 é um herbicida para o controlo de infestantes dicotiledóneas anuais em vinha, macieira, pereira, trigo, cevada, aveia, centeio e tritcale.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

UFI: U5C1-U0PP-400J-MSOG



3 362130 067719 >

Autorização de venda n.º 2350
concedida pela DGAV

Titular da autorização de venda:
Corteve Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno, 48-6º, Esq. Edifício Taurus
1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteva.pt

CONTEÚDO: 1 L e

O CENT-7® é um herbicida para o controlo de infestantes dicotiledóneas anuais em vinha, macieira, pereira, trigo, cevada, aveia, centeio e tritcale.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Classificação do modo de acção da substância ativa conforme HRAC GRUPO 29 HERBICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Dose/Ha		Aplicações
	Produto	Calda	
Macieira	6 a 8 L	400 L a 800 L	- A partir da plantação e durante o repouso vegetativo das culturas. - Em pré-emergência das infestantes.
Vinha Pereira	4,8 L		- O terreno deve estar limpo de infestantes, bem preparado, sem torrões e se possível com alguma humidade.
Trigo Cevada Aveia Centeio Tritcale	1 L	400 L a 800 L	- Em pré-emergência das culturas - A aplicação deve ser feita a seguir à sementeira, normalmente 4-5 dias após esta. - O terreno deve estar bem preparado, sem torrões com humidade à superfície e a semente bem enterrada.

O CENT-7 é absorvido pelas radículas das infestantes inibindo os seus primeiros estados de desenvolvimento. Provoca o entumescimento das zonas meristemáticas, seguida de necrose e morte das infestantes. Actua principalmente por inibição da síntese proteica nas plantas.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS: Pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), junco-dos sapos (*Juncus bufonius*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), ranúnculo-dos-campos (*Ranunculus arvensis*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), amor-perfeito-bravo (*Viola arvensis*), esparguta (*Spergula arvensis*), urtiga-menor (*Urtica urens*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), verónicas (*Veronica* spp.).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS: Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*).
INFESTANTES RESISTENTES: Todas as gramíneas e ainda agulha-do-pastor (*Scandix pecten-veneris*), amor-de-hortelão (*Galium aparine*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*) e outras vivazes.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calcule previamente o débito do material de aplicação. Não utilizar atomizadores na aplicação do produto. Após a aplicação do herbicida, lavar o material com água e detergente. Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco. A máxima eficácia é conseguida quando se aplica em pré-emergência das infestantes e se o produto tiver sido incorporado através da chuva ou de rega.



0287044

2404