

**Clincher<sup>®</sup>**  
**PLUS**

**HERBICIDA**

**Concentrado para emulsão (EC)**  
**com 200 g/L ou 21,05 % (p/p) de cihalofop-butilo**

**CLINCHER PLUS** é um herbicida selectivo para a cultura do arroz,  
tanto de sementeira directa como de transplantação

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL**

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,**

**RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Lote n.º e Data de produção: ver embalagem

**UFI: JX97-201Y-800J-5E1A**



Distribuído por:

**Lusosem**  
*produtos para agricultura, S.A.*

Rua General Ferreira Martins, n.º10-9ºA

1495-137 ALGÉS

Tel: 214131242 - Fax: 214131284

e-mail: [lusosem@lusosem.pt](mailto:lusosem@lusosem.pt) • [www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

Autorização de venda

n.º 0477 concedida pela DGAV

**Titular da autorização de venda:**

**Corteva Agriscience Portugal, S.A.**

Campo Pequeno, 48-6º,

Esq. Edifício Taurus

1000-081 Lisboa, Portugal

Tel: +351 217 998 030

[www.corteva.pt](http://www.corteva.pt)

<sup>TM</sup> Marcas registadas da Corteva Agriscience e das  
suas companhias afiliadas



3 362130 141242 >

**CONTEÚDO: 5 L e**

0287295

2501



**Este documento só pode ser usado como  
ferramenta de consulta. O rótulo atual do  
produto é aquele impresso na embalagem no  
momento da compra.**

**CLINCHER® PLUS** contém a substância activa cihalofop-butilo, pertencente à família química ariloxifenoxipropionato. Apresenta rápida absorção foliar e moderada translocação no simplasto, com acumulação nos órgãos meristemáticos. Actua por inibição da biossíntese dos ácidos gordos (inibindo a actividade da enzima acetil Coenzima A carboxilase, ACCase).

## **CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS**

Classificação do modo de acção da substância activa conforme HRAC

|              |          |                  |
|--------------|----------|------------------|
| <b>GRUPO</b> | <b>1</b> | <b>HERBICIDA</b> |
|--------------|----------|------------------|

## **UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

**CLINCHER PLUS** pode ser aplicado em arroz de sementeira directa e de transplantação.

O produto deve ser aplicado uma vez por campanha na dose de 1,5 L/ha.

Dose de 1,5 L/ha: A aplicação deve realizar-se estando a cultura entre a primeira folha verdadeira (BBCH 11) e o fim do afilamento (BBCH 29).

- Para o controlo de *Echinochloa* spp., tratar quando esta infestante se encontre no estado de uma a quatro folhas.
- Para o controlo de *Leptochloa fascicularis*, tratar quando esta infestante se encontre no estado de duas a quatro folhas.
- A aplicação para controlo de *Paspalum distichum* deve ser realizada até ao pleno afilamento do arroz.

Para tratamentos tardios contra *Echinochloa* spp, utilizar na dose de 2 L/ha. O tratamento pode ser realizado até ao fim do alongamento do caule do arroz (BBCH 30-45).

**Infestantes susceptíveis:** *Echinochloa* spp., *Leptochloa* spp., *Panicum dithomiflorum*, *Paspalum distichum*.

**Infestantes moderadamente susceptíveis:** *Digitaria sanguinalis* e *Setaria* spp.

**Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.**

**Intervalo de Segurança - 60 dias em arroz.**

### **PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS**

- A mistura de **CLINCHER PLUS** com herbicidas fenoxiderivados (MCPA) pode, nalguns casos, reduzir a eficácia herbicida do **CLINCHER PLUS** sobre *Echinochloa* spp.
- Para misturas com outros herbicidas usados na cultura do arroz, consultar previamente o Serviço Técnico da Corteva Agriscience.
- A aplicação de **CLINCHER PLUS** não constitui qualquer incompatibilidade com posteriores aplicações de produtos insecticidas ou herbicidas autorizadas para o arroz e de utilização habitual nesta cultura.
- Evitar o arrastamento para as culturas adjacentes, especialmente milho e fruteiras.
- Evitar aplicar o produto depois de decorridas 6 horas após a realização da calda. Caso não seja possível, coar a calda por um filtro com malha > 300 µm.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha substâncias activas da família química ariloxifenoxipropionato, mais do que uma vez por campanha.

### **MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA**

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária.

Juntar a quantidade de **CLINCHER PLUS** a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

### **MODO DE APLICAÇÃO**

**CLINCHER PLUS** não necessita de adição de molhante, já que este se encontra incorporado na formulação. Previamente à aplicação de **CLINCHER PLUS**, baixar ao mínimo o nível de água da parcela, e mantê-la nesse nível até 24/48 horas depois da aplicação. Uma pequena quantidade de água no campo, no momento da aplicação, sempre que as folhas das infestantes estejam acima do nível de água, não diminui a eficácia do tratamento. Não verter para o exterior as águas dos arrozais tratados até que tenham decorrido 24 horas.

As aplicações podem ser realizadas tanto por meios aéreos como terrestres, exceto no caso dos tratamentos tardios contra *Echinochloa* spp onde as aplicações apenas poderão ser terrestres.

**Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.**

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a  $2 \text{ kg/cm}^2$  e/ou usar bicos anti-arrastamento. Recomenda-se o uso de bicos anti-arrastamento com uma redução de pelo menos 75%.

Volume de calda a utilizar: 200-400 L/ha em aplicação terrestre e 100 L/ha em aplicação aérea.

Na aplicação terrestre utilizar pulverizador hidráulico transportado por tractor.

**ADVERTÊNCIA:** As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

Edição CLP3

**Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.**

**Clincher<sup>®</sup>**  
**PLUS**

**HERBICIDA**

**Concentrado para emulsão (EC)**  
**com 200 g/L ou 21,05 % (p/p) de cihalofop-butilo**

**CLINCHER PLUS** é um herbicida selectivo para a cultura do arroz,  
tanto de sementeira directa como de transplantação

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL**

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,**

**RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Lote n.º e Data de produção: ver embalagem

**UFI: JX97-201Y-800J-5E1A**



Distribuído por:

**Lusosem<sup>®</sup>**  
*produtos para agricultura, S.A.*

Rua General Ferreira Martins, n.º10-9ºA

1495-137 ALGÉS

Tel: 214131242 - Fax: 214131284

e-mail: lusosem@lusosem.pt • www.lusosem.pt

Autorização de venda

n.º 0477 concedida pela DGAV

**Titular da autorização de venda:**

**Corteva Agriscience Portugal, S.A.**

Campo Pequeno, 48-6º,

Esq. Edifício Taurus

1000-081 Lisboa, Portugal

Tel: +351 217 998 030

www.corteva.pt

<sup>TM</sup> Marcas registadas da Corteva Agriscience e das  
suas companhias afiliadas



**CONTEÚDO: 5 L e**



**Este documento só pode ser usado como  
ferramenta de consulta. O rótulo atual do  
produto é aquele impresso na embalagem no  
momento da compra.**

## **PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

### **ATENÇÃO**

- H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P280 Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.
- P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
- P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- P391 Recolher o produto derramado.
- EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
- SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem, exceto nas aplicações em arrozais nas doses indicadas.
- SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros no caso de tratamentos aéreos.
- SPePT2 Após reposição do nível de água nos canteiros, os mesmos deverão permanecer fechados durante 4 dias, podendo a circulação de água ser reposta ao fim deste período.
- SPePT3 No caso de aplicações aéreas, tomar em consideração os aspetos inerentes a esta técnica de aplicação, de modo a não contaminar as áreas circunvizinhas.


**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250**

**Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares**



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

**CONTEÚDO: 5 L e**



**Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.**