

DRONSAR

INSECTICIDA DE CONTACTO E INGESTÃO

Concentrado para emulsão (EC) com 25g/L ou 2,74% (p/p) de deltametrina

Autorização de venda n.º 1447
concedida pela DGAV

UFI: 3740-Q03H-300A-7M41



Titular da autorização de venda:

SARABIA

EXCLUSIVAS SARABIA S.A. Polig. ind. "Fondo de Litera"
Autovia A2 Km. 441,6 - 22520 FRAGA (Huesca)
Tel. 973 73 73 77 www.sarabia.eu / sarabia@sarabia.eu

Distribuidor por:

Lusosem

Lusosem: R. Gen. Ferreira Martins n.º 10 9.º A,
1495-137 Algés, Portugal. Tel. +351 21 413 1242

Lote/data de fabricação: veja na embalagem

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANter FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**

Atenção



EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

H315 - Provoca irritação cutânea.

H319 - Provoca irritação ocular grave.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391 - Recolher o produto derramado.

P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. **SPe3** - Para proteção dos artrópodes não-visados, respeitar uma zona não pulverizada de 40 m em pomóideas (**macieira, pereira, pereira-nashi, marmeleiro**), prunóideas (**pessegueiro** incluindo **nectarina** e **damasqueiro**) e **amendoeira**; 30 m em oliveira; 15 m em videira e 10 m em **batateira, tomateiro, beringela, aboborinha, pepino, pepininhos, meloeiro** e **melancia**, às zonas não cultivadas, utilizando bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto. **SPe3** - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30 m em pomóideas (**macieira, pereira, pereira-nashi, marmeleiro**), prunóideas (**pessegueiro** incluindo **nectarina** e **damasqueiro**) e **amendoeira**; 20 m em **oliveira**; 15 m em videira e 10 m em **batateira, tomateiro, beringela, aboborinha, pepino, pepininhos, meloeiro** e **melancia**, às águas de superfície, utilizando bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto. **SPe8** - Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração. **SPoPT5** - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TEL.: 800 250 250.

O DRONSAR é um insecticida piretróide, com acção por contacto e ingestão. Actua no sistema nervoso dos insetos, como modulador dos canais de sódio (IRAC MoA- subgrupo 3A).

Intervalo de segurança:

3 dias em **tomateiro, beringela, aboborinha (courgette), pepino, pepininhos, meloeiro, melancia e pimenteiro**; 7 dias em **macieira, pereira, pereira-nashi, marmeleiro, pessegueiro** (incluindo **nectarinas**), **damasqueiro, videira e batateira**; 30 dias em **amendoeira**.

Precauções biológicas:

Para evitar o desenvolvimento de resistências recomenda-se a alternância deste produto com insecticidas com diferentes modos de ação.

Gestão de embalagens:

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Armazenar num local fresco, seco e bem ventilado.



Utilizações, doses/concentrações, épocas e condições de aplicação:

Cultivos e pragas	Concentração e Dose de aplicação	Volume de calda	Época e número máximo de aplicações
Macieira: Afídeo-verde-da-macieira (<i>Aphis pomi</i>), Afídeo-dos-citrinos (<i>Aphis spiraeicola</i>), Pulgão-lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Afídeos (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Rhopalosiphum insertum</i>), Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), Afídeo-cinzentos (<i>Dysaphis plantaginea</i>) e Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	1000(L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Pereira e pereira-nashi: Afídeo-verde-da-pereira (<i>Aphis pyri</i>), Afídeo-dos-citrinos (<i>Aphis spiraeicola</i>), Afídeo-cinzentos (<i>Dysaphis pyri</i>) e Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	1000(L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Marmeleiro: Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	1000(L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Pessegueiro (incluindo nectarina) e damasqueiro: Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>) e Mosca-da-fruta (<i>Ceratitis capitata</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	1000(L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Amendoeira: Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	1000(L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Videira: Traça-dos-cachos (<i>Lobesia botrana</i>).	40 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 400 ml/ha)	800-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Oliveira: Traça-da-oliveira (<i>Prays oleae</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	1000(L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga, geração antófaga, na floração (20% das flores abertas - BBCH 62) Máximo de 1 aplicação.
Bateira: Escaravelho-da-bateira (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	600-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Tomateiro (ar livre): Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>), Afídeos (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Chrysodeixis calcites</i>), Traça-do-tomateiro (<i>Tuta absoluta</i>), Nóctua-cinzentas (<i>Agrotis segetum</i>), Lagartas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Beringela (ar livre): Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>), Afídeos (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Spodoptera littoralis</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Aboborinha (courgette) (ar livre): Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>), Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), Lagartas (<i>Autographa gamma</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Spodoptera littoralis</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Pepino e Pepininhos (cournichons ou pepinos para conserva) (ar livre): Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>), Afídeo-da-alfaca (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), Nótuas (<i>Agrotis ipsilon</i>), Nótua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Spodoptera sp.</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Meloeiro (ar livre): Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>), Afídeo verde (<i>Myzus persicae</i>), Lagartas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera sp.</i> , <i>Spodoptera exigua</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Nótuas (<i>Agrotis ipsilon</i>), Nótua-cinzentas (<i>Agrotis segetum</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Melancia (ar livre): Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>), Afídeos (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Lagartas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera sp.</i> , <i>Spodoptera exigua</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.
Pimenteiro (ar livre): Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), Afídeo-dos-citrinos (<i>Aphis gossypii</i>), Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Spodoptera sp.</i>), Nótuas (<i>Agrotis sp.</i>).	50 ml/hl (não ultrapassar a dose máxima 500 ml/ha)	300-1000 (L/ha)	Aplicar ao aparecimento da praga: Máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias.

NÃO DESCOLAR

Modo de preparação da calda: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

Modo de aplicação: Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

NOTA: As recomendações e informações facultadas são o resultado de estudos e ensaios, amplos e rigorosos. Contudo, numerosos factores fora do nosso controlo podem intervir durante o seu uso (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável por estragos (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc) causados pela não observância total ou parcial das instruções contidas no rótulo.