

10L



in GREEN - N

91003709

ACELERADOR DE PERFORMANCE

Com Ureia formaldeído

SC
Suspensão Concentrada

VINHA
CEREAIS
BATATA
GIRASSOL
MILHO
FRUTEIRAS



NUTRITION

DE SANGOSSE



Na essência do crescimento

in GREEN-N

Aduto inorgânico elemental líquido de macronutriente – CFP1.(C)(I)(b)(i)
N, (MgO, SO₃) Solução fertilizante 23,1 (2,5-5,2)

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÕES FOLIARES (OU EM FERTIRRIGAÇÃO)

PRINCIPAIS CULTURAS	DOSE/HA	VOLUME DE ÁGUA	ÉPOCAS DE APLICAÇÃO
VINHA	5-10 L	200 L/ha	Objectivo nutritivo: 2 aplicações desde as folhas livres até aos botões florais separados (antes da floração) Objectivo de melhoria de azoto nos mostos e aromas no vinho: 2 aplicações, com intervalo de 15 dias, no pintor
CEREAIS	15-20 L	100 L/ha	Desde a saída da última folha até ao espigamento
BATATA	10-20 L	200 L/ha	Antes do início da floração até à floração
GIRASSOL	15-20 L	100 L/ha	Desde 5 a 6 pares de folhas até ao aparecimento do botão floral
MILHO	15-20 L	200 L/ha	Desde as 5-6 folhas e 10-15 dias mais tarde, se necessário
ÁRVORES DE FRUTO	5-10 L	500 L/ha	Objectivo nutritivo: 1-2 aplicações desde o aparecimento das primeiras folhas (não aplicar na floração) Reposição de reservas - pós-colheita: 1 aplicação pós-colheita e depois da queda das folhas

Respeitar os conselhos de utilização, doses, modo de emprego e precauções mencionadas na embalagem. É da responsabilidade do agricultor conduzir a cultura e os tratamentos segundo as boas práticas agrícolas, de acordo com os factores particulares da sua exploração.

O fabricante garante a qualidade e a conservação deste produto, dentro da embalagem fechada original, durante o período máximo de 36 meses. É garantida a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor.

P102 : Manter fora do alcance das crianças.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais / internacionais de locais / regionais

Este adubo contém ureia, que pode libertar amónio com impacto na qualidade do ar. Dependendo das condições locais, devem ser tomadas medidas de reparação adequadas.

Fabricado por :

DE SANGOSSE

«Bonnell» - BP5 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE
- Tél: 05.53.69.36.30



Distribuidor : LUSOSEM - R. General Ferreira Martins,
n° 10 - 9°A 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242
- lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

Lusosem

COMPOSIÇÃO

Azoto (N) total : 23,1% (300 g/L)

Azoto, na forma de azoto ureico (N) total : 15,4%

Azoto (N) proveniente de Ureia-formaldeído : 77%

Oxido de Magnésio (MgO) solúvel em água : 2,5% (33 g/L)

Trióxido de enxofre (SO₃) solúvel em água : 5,2% (67 g/L)

Utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade.

Não exceder a dose de aplicação.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Ingredientes:

Ureia CAS 57-13-6 (CMC1*)

Ureia – formaldeído CAS:9011-05-6 (CMC8*)

Sulfato de Magnésio CAS: 10034-99-8 (CMC1*)

*CMC1: Substâncias e misturas à base de matéria virgens

*CMC8 : Polímeros de nutrientes

CONSELHOS PRÁTICOS DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA CALDA

Para uma eficácia óptima, usar um volume de calda por hectare adequado para obter uma distribuição homogénea da solução sobre as folhas, sem provocar escorrimento da calda. Efectuar os tratamentos preferencialmente entre os 6°C e os 25°C. Agitar a embalagem antes de usar. Após colocar água na cuba e o agitador a funcionar, adicionar progressivamente o produto. Lavar a embalagem do produto duas vezes.

Em caso de mistura com outros produtos efectuar previamente um teste e por fim incorporar este produto.

PRECAUÇÕES GERAIS

Armazenar num local seco e fresco. Em caso de incidente lavar imediatamente com água abundante.

PESO LÍQUIDO
12,8 kg



Na essência do crescimento