

10L



in GREEN - Ultra^{NG}

91017259

ACTIVADOR BIONUTRICIONAL

Efeito greening
Desenvolvimento radicular

ABN
Aminoácidos
Quelato

BATATA
HORTÍCOLAS
VINHA
FRUTEIRAS
OLIVAL
CEREAIS



DE SANGOSSE

in
NUTRITION

Na essência do crescimento



APLICAÇÕES FOLIARES OU NA FERTIRRIGAÇÃO CONCENTRAÇÃO MÁXIMA: 5% (5 L por 100 L de ÁGUA)

Cultura	Dose Máxima (L/Ha) Por aplicação	Aplicação Máxima por ano	Época de Aplicação
Cereais	5 L	4	Desde o afilamento até ao emborrachamento. Desde a saída da última folha até ao espigamento
Hortícolas		8	3 a 4 aplicações desde a tubérização com aplicações com intervalos de 15 dias.
Vinha		8	Desde a floração
Fruteiras, Cítricos, Culturas em Viveiro		8	Desde início da cultura. Em condições de desenvolvimento difíceis
Oleaginosas - Proteaginosas Beterraba		4	3 a 4 aplicações, todos os 15 dias, desde o início da cultura
Potato		8	Cachos separados - Floração - Desde o vingamento todos os 15 dias.
Forragens		8	4 aplicações, desde a queda das pétalas, com intervalos de 15 dias entre aplicação

Contém oligoelementos: utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade.

- A utilização de equipamento adequado e bem conservado e a implementação de protecção colectiva constituem a primeira medida preventiva contra os riscos profissionais, antes da utilização da protecção individual.

- O uso de fato de trabalho ou EPI deve estar associado a cuidados de higiene (ex.lavagem de mãos, tomar duche no final do tratamento) e comportamento rigoroso (ex: procedimento de vestir/despir).

- Os procedimentos de limpeza e armazenamento de macacões e EPIs reutilizáveis devem obedecer às respectivas instruções de uso.

ATENÇÃO

H319 Provoca irritação ocular grave.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337 + P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais / internacionais de locais / regionais.

UFI : NSU1-10W9-T00V-CNXX

Fabricado por :

DE SANGOSSE

«Bonnell» - BP5 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE

- Tél: 05.53.69.36.30



Distribuidor : LUSOSEM - R. General Ferreira Martins,
n° 10 - 9ª A 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242
- lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

Lusosem

Interesse Agronómico:

- Melhora a fotossíntese pelo fornecimento de aminoácidos e oligoelementos
- Melhora a assimilação de nutrientes do solo pelo fornecimento de aminoácidos e oligoelementos
- Melhora a tolerância ao stress abiótico pelo fornecimento de aminoácidos

Composição :

8,6% Azoto (N) total (104 g/L)
7,2% Azoto ureico
3% Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água (36 g/L)
7% óxido de potássio (K2O) solúvel em água (85 g/L)
0,04% Boro (B) solúvel em água (500 mg/L)
0,01% Cobre (Cu) solúvel em água quelato EDTA (140 mg/L)
0,02% Ferro (Fe) solúvel em água quelato EDTA (250 mg/L)
0,04% Manganês (Mn) solúvel em água quelato EDTA (500 mg/L)
0,004% Molibdénio (Mo) solúvel em água (50 mg/L)
0,03% Zinco (Zn) solúvel em água quelato EDTA (400 mg/L)

Aminoácidos livres totais de origem vegetal: 2%

Matéria Seca: 38%

Densidade do Produto: 1,2

Conselhos práticos de utilização

PREPARAÇÃO DA CALDA

Para uma eficácia óptima, usar um volume de calda por hectare adequado para obter uma distribuição homogénea da solução sobre as folhas, sem provocar escorrimento da calda. Efectuar os tratamentos preferencialmente entre os 6°C e os 25°C. Agitar a embalagem antes de usar. Após colocar água na cuba e o agitador a funcionar, adicionar progressivamente o produto. Lavar a embalagem do produto duas vezes.

Em caso de mistura com outros produtos efectuar previamente um teste e por fim incorporar este produto.

PRECAUÇÕES GERAIS

Armazenar num local seco e fresco. Em caso de incidente lavar imediatamente com água abundante.

Respeitar os conselhos de utilização, doses, modo de emprego e precauções mencionadas na embalagem. É da responsabilidade do agricultor conduzir a cultura e os tratamentos segundo as boas práticas agrícolas, de acordo com os factores particulares da sua exploração.

O fabricante garante a qualidade e a conservação deste produto, dentro da embalagem fechada original, durante o período máximo de 36 meses. É garantida a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor.



PESO LÍQUIDO
12 kg



Na essência do crescimento