

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 - Usar luvas de proteção.

P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 - Recolher o produto derramado.

P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3PT1 - Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

SPe3PT2 - Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50 % de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto.

SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 - Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250.

Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI: 4M47-P08C-800V-47WA



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



Suspensão concentrada (SC) com florasulame 75 g/L (6,8% p/p) + penoxsulame 150 g/L (13,6% p/p)
Contem: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Herbicida de pré-emergência e pós-emergência precoce para o controlo de infestantes de folha larga em citrinos e olival.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda n.º 0735 concedida pela DGAV
Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

Titular da autorização de venda:
Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno, 48-6º, Esq.
Edifício Taurus
1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteva.pt

Distribuído por:
Lusosem
produtos para agricultura, S.A.
Rua General Ferreira Martins,
nº10-9ª 1495-137 ALGÉS
Tel: 214131242, Fax: 214131284
e-mail: lusosem@lusosem.pt
www.lusosem.pt

CONTEÚDO: 1 L e

TM © Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

RUEDO® é um herbicida para o controlo de infestantes de folha larga em pré e pós-emergência precoce em oliveira e citrinos.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

RUEDO é um herbicida sistémico com base em florasulame e penoxsulame, pertencentes à família química das triazolopirimidinas. É absorvido por via foliar e radicular (inibe a atividade da enzima acetolactato sintase, ALS).

Classificação do modo de ação da substância ativa conforme HRAC

GRUPO	2,2	HERBICIDA
-------	------------	-----------

UTILIZAÇÕES, DOSE/CONCENTRAÇÃO, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO.

Cultura	Inimigo	Volume de calda (L/ha)	Dose (L/ha)	Época ou estado fenológico	Técnica e equipamento de aplicação	Nº máx aplicações	I. S.
Oliveira	Infestantes dicotiledóneas anuais	100 - 400	0.08 - 0.1	Aplicar durante todo o ciclo cultural até à maturação dos frutos (BBCH 00 - 89), em pré ou pós-emergência precoce das infestantes, até às 2 folhas	Pulverização dirigida ao solo (tratando, no máximo, 50% da superfície total) com recurso a pulverizador montado no trator ou com pulverizador de dorso.	1	15
Citrinos: (todos os citrinos e seus híbridos)	Infestantes dicotiledóneas anuais			Aplicar durante todo o ciclo cultural até à maturação dos frutos (BBCH 00 - 89), em pré ou pós-emergência precoce das infestantes, até às 2 folhas	Pulverização dirigida ao solo (tratando, no máximo, 50% da superfície do terreno) com recurso a pulverizador montado no trator ou com pulverizador de dorso.		30

Infestantes suscetíveis:

Em Citrinos: *Amaranthus retroflexus* (brejo), *Portulaca oleracea* (beldroega-comum), *Erigeron bonariensis* (avoadinha-peluda), *Raphanus raphanistrum* (saramago), *Diplotaxis erucoides* (grizandra branca), *Sonchus oleraceus* (serralha-branca), *Chenopodium album* (catasso), *Amaranthus blitoides* (erva-aranha), *Malva sylvestris* (malva-comum).

Em Oliveira: *Diplotaxis virgata* (grizandra), *Sonchus oleraceus* (serralha-branca), *Sonchus arvensis* (serralha), *Cirsium arvense* (cardo-das-vinhas), *Capsella bursapastoris* (bolsa-do-pastor), *Raphanus raphanistrum* (saramago), *Sinapis arvensis* (mostarda-dos-campos), *Erigeron bonariensis* (avoadinha-peluda), *Erigeron canadensis* (avoadinha), *Stellaria media* (morugem-branca), *Urtica dioica* (urtiga), *Urtica urens* (urtiga menor), *Calendula arvensis* (maravilha), *Malva neglecta* (malva-redonda), *Malva sylvestris* (malva-comum), *Picris echioides* (raspa-saias), *Lamium amplexicaule* (lâmio-violeta).

Infestantes moderadamente suscetíveis: *Euphorbia chiapensis*

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Manter uma distância mínima de segurança de 5 m para evitar a deriva sobre os cultivos adjacentes (beterraba, algodão, tomate, girassol, melão e frutas com caroço). Para evitar o desenvolvimento de biótipos resistentes não aplicar não aplicar este herbicida mais de três anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância com outros herbicidas de diferente modo de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Utilizar a pressão de pulverização e a menor altura de barra possível que garantam uma boa distribuição do herbicida pulverizado.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES

Aplicar o tratamento em dias aprazíveis, sem vento (ou com ventos que tenham uma velocidade inferior a 5 m/s) e a temperaturas moderadas.

Aplicação em bandas, ocupando máximo 50% da superfície total do terreno.

ADVERTÊNCIA: Aplicação em bandas, ocupando máximo 50% da superfície do terreno. As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.