

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



H226 -Líquido e vapor inflamáveis.

H304 -Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 -Provoca irritação cutânea.

H317 -Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H319 -Provoca irritação ocular grave.

H335 -Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 -Pode provocar sonolência ou vertigens.

H410 -Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P210 -Manter afastado do calor, superfícies quentes, fiação, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P270 -Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 -Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P301+P310 -EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302+P352 -SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.

P305+P351+P338 -SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P331 -NÃO provocar o vômito.

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco

P501a -Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 -Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 -Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SP3 -Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros em milho, trigo e cevada e de 10 metros em oliveira e citrinos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250.

Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI: XU54-MODY-U00U-09YC



Starane® 20

HERBICIDA

Concentrado para emulsão (EC) com 200 g/l ou 20,6% (p/p) de Fluroxipir (na forma de éster metilheptílico)
Contém hidrocarbonetos, C9, aromáticos e hidrocarbonetos, C10, aromáticos, < 1% naftaleno

Herbicida para o controlo em pós-emergência de infestantes de folha larga (dicotiledóneas), nas culturas de trigo, cevada, milho, oliveira, citrinos, macieira, pereira, avelã e prados de gramíneas

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda n.º 0156 concedida pela DGAV

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem



Rua General Ferreira Martins,
n.º 10-9A 1495-137 ALGÉS
Tel: 214131242, Fax: 214131284
e-mail: lusosem@lusosem.pt
www.lusosem.pt

Titular da autorização de venda:
Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno, 48-6º, Esq. Edifício Taurus
1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteva.pt

CONTEÚDO: 500ML e

STARANE® 20 é um herbicida pertencente ao grupo químico dos ácidos piridinocarboxílicos, sistémico de pós-emergência contra infestantes dicotiledóneas anuais nas culturas de trigo, cevada e milho, oliveira, citrinos, macieira, pereira e avelã, prados de gramíneas.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Classificação do modo de acção da substância ativa conforme HRAC

GRUPO	4	HERBICIDA
-------	---	-----------

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Trigo e cevada: 0,75 a 1 L/ha desde o estado de três folhas do cereal até ao fim do encanamento.

Milho: 0,75 a 1 L/ha entre 3 e 5 folhas da cultura.

Oliveira, citrinos, macieira, pereira e avelã: 1,5 L/ha. Em Oliveira aplicar depois da colheita.

Prados de gramíneas: 1,5-2 L/ha desde as três folhas da gramínea. Para o controlo de Rumex, aplicar no estado de roseta. Volume de calda: 200-600 L/ha.

Aplicar o **STARANE 20** quando as infestantes estiverem em crescimento ativo.

Infestantes Suscetíveis: Malvão (*Abutilon theophrasti*), coriola (*Convolvulus arvensis*), *Galium* spp., malvas (*Malva* spp.), não-mesquites (*Myosotis arvensis*), parietárias (*Parietaria* spp.), beldroega (*Portulaca oleracea*), *Poligonum* spp., ruiva-dos-tintureiros (*Rubia tinctorum*), silvas (*Rubus* spp.), labiadas (*Rumex* spp.), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), tojos (*Ulex* spp.) e urtigas (*Urtica* spp.).

UTILIZAÇÕES MENORES

Todos os usos indicados de seguida estão aprovados como utilizações menores. A eficácia e fitotoxicidade resultantes desta utilização menor são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

- Papoila dormideira (produção morfina): 1 L/ha. Aplicar o produto com a cultura no estado de 4 a 6 folhas verdadeiras, efetuando o máximo de 1 aplicação. Volume de calda de 200 L/ha. Precaução ambiental adicional: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m, em relação às águas de superfície.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

O uso repetido de herbicidas com o mesmo modo de acção, sobre a mesma parcela, pode aumentar o risco de aparecimento de biótipos resistentes a esse modo de acção. Assim, recomenda-se a não utilização consecutiva de produtos que possuam o mesmo modo de acção e integrar estratégias de luta química com outras estratégias de luta, tais como culturais e físicas.

Após a aplicação de **STARANE 20** recomenda-se:

- Não aplicar em plantações de árvores com menos de 4 anos.
- Evitar tratar em períodos de frio prolongado, e com temperaturas inferiores a 6°C.
- Evitar a aplicação durante as horas de maior temperatura durante o verão.
- Não aplicar em prados se existirem trevos ou outras leguminosas.
- Não aplicar em dias de vento e tomar precauções para evitar danos em culturas adjacentes.
- Não molhar as árvores, em especial os rebentos jovens.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: No recipiente onde se prepare a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO: Calibrar o pulverizador calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de arrastamento, evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores. Após a aplicação lavar bem o material com água e detergente.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



TM e Marcas registadas de Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

PERIGO

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.